

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»



СБОРНИК

программ и заданий

**Физтех-школа аэрокосмических технологий
(ФАКТ)**

**для студентов 2 курса
на весенний семестр
2020–2021 учебного года**

МОСКВА
МФТИ
2021

Сборник программ и заданий для студентов 2 курса на весенний семестр 2020–2021 учебного года. Физтех-школа аэрокосмических технологий (ФАКТ). – Москва : МФТИ, 2021. – 56 с.

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2021 года

ПРОГРАММА

по дисциплине: Общая физика: оптика
по направлению подготовки: 03.03.01 «Прикладные математика и физика»
физтех-школа: для всех физтех-школ
кафедра: общей физики
курс: 2
семестр: 4

Трудоёмкость:

теор. курс: базовая часть – 4 зачет. ед.;

физ. практикум: базовая часть – 3 зачет. ед.;

лекции – 30 часов

практические (семинарские)

занятия – 30 часов

лабораторные занятия – 60 часов

Экзамен – 4 семестр

Диф. зачёт – 4 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 120

Самостоятельная работа:

теор. курс – 90 часов

физ. практикум – 75 часов

Программу и задание составили:

к.ф.-м.н., проф. В. А. Петухов
к.ф.-м.н., доц. К. М. Крымский
к.ф.-м.н., доц. Л. М. Колдунов
к.ф.-м.н., доц. П. В. Попов
к.т.н., доц. В. А. Овчинкин
к.ф.-м.н., доц. Ю. Н. Филатов

Программа принята на заседании кафедры
общей физики 4 декабря 2020 г.

Заведующий кафедрой

д.ф.-м.н., профессор

А. В. Максимычев

ОПТИКА

1. Геометрическая оптика. Принцип Ферма, законы преломления и отражения. Полное внутреннее отражение. Оптические инструменты: телескоп, микроскоп. Понятие о геометрических aberrациях. Элементы фотометрии: яркость источника, освещённость изображения.

Современные применения геометрической оптики в пределе коротких длин волн: рентгеновская микроскопия, проекционная рентгеновская литография, рентгеновская астрономия, микроанализ с пространственным разрешением.

2. Волновая оптика. Волновое уравнение, монохроматические волны, комплексная амплитуда, уравнение Гельмгольца, плоские и сферические волны, показатель преломления, фазовая скорость распространения. Поляризация света: линейная, круговая и эллиптическая. Естественный свет. Степень поляризации. Формулы Френеля, угол Брюстера.

Нерелятивистский эффект Доплера, поиск экзопланет.

3. Дисперсия показателя преломления, классическая теория дисперсии, нормальная и аномальная дисперсии. Комплексная диэлектрическая проницаемость и комплексный показатель преломления, связь мнимой части с поглощением света средой. Затухающие волны, закон Бугера. Показатель преломления плазмы. Радиоволны в ионосфере и дальняя радиосвязь. Групповая скорость. Распространение волнового пакета в неоднородной среде. Различные диапазоны длин волн, их особенности. Метаматериалы.

4. Принцип суперпозиции и интерференция монохроматических волн. Видность полос, ширина полосы. Просветление оптики. Статистическая природа излучения квазимонохроматической волны. Временная когерентность, функция временной когерентности, связь со спектральной интенсивностью (теорема Винера–Хинчина) и с видностью. Ограничение на допустимую разность хода в двухлучевых интерференционных схемах, соотношение неопределенностей.

5. Интерференция при использовании протяженных источников. Пространственная когерентность, радиус когерентности, функция пространственной когерентности, связь с распределением интенсивности излучения по источнику (теорема Ван Циттерта–Цернике). Ограничения на допустимые размеры источника и апертуру интерференции в двухлучевых схемах. Лазеры как источники излучения с высокой временной и пространственной когерентностью.

6. Дифракция волн. Принцип Гюйгенса–Френеля. Дифракция на тонком экране. Граничные условия Кирхгофа. Волновой параметр. Дифракция Френеля. Задачи с осевой симметрией, зоны Френеля, спираль Френеля.

Зонные пластинки, линза. Использование зонных пластинок для фокусировки рентгеновского излучения. Дифракция на дополнительном экране, пятно Пуассона. Дифракция на системе дополнительных экранов, теорема Бабинэ. Дифракция на краю, спираль Корню.

7. Дифракция Фраунгофера. Световое поле в зоне Фраунгофера как преобразование Фурье граничного поля. Дифракция Фраунгофера на щели, дифракционная расходимость. Дифракционный предел разрешения телескопа и микроскопа. Поле в фокальной плоскости линзы, поперечные и продольные размеры фокального пятна.

8. Спектральные приборы: призма, дифракционная решётка, интерферометр Фабри–Перо. Характеристики спектральных приборов: разрешающая способность, область дисперсии, угловая дисперсия.

Интерференция в тонких пленках и многослойных структурах, зеркала с высоким коэффициентом отражения. Искусственные многослойные структуры для отражения мягкого рентгеновского излучения. Радиотехнические аналоги дифракционных решеток.

9. Принципы фурье-оптики. Метод Рэлея решения задачи дифракции: волновое поле как суперпозиция плоских волн разных направлений (пространственное фурье-разложение), соотношение неопределённости. Дифракция Френеля на периодических структурах (эффект саморепродукции). Теория Аббе формирования оптического изображения, принцип двойной дифракции. Апертура, полоса пропускания пространственных частот оптической системы, связь с разрешающей способностью. Разрешающая способность при когерентном и некогерентном освещении.

10. Принципы голографии. Голограмма Габора. Голограмма с наклонным опорным пучком. Разрешающая способность голограммы. Условие Брэгга–Вульфа. Объёмная голограмма, объёмная решётка в регистрирующей среде.

Представление о голографической микроскопии биообъектов и голографической интерферометрии.

11. Кристаллооптика. Дихроизм, поляроиды, закон Малюса. Двойное лучепреломление в одноосных кристаллах, разложение волны на обыкновенную и необыкновенную. Взаимная ориентация векторов k , E , D , B , направление вектора Пойнтинга, боковой снос световых пучков в кристаллах. Интерференционные явления в кристаллических пластинках. Понятие об искусственной анизотропии. Эффекты Фарадея, Керра и Поккельса и их применение.

12. Рассеяние света. Эффективное сечение рассеяния, диаграмма направленности, их зависимость от длины волны и от размера рассеивающих частиц, Рэлеевское рассеяние (рассеяние на флуктуациях плотности). Поляризация рассеянного света.

13. Нелинейные оптические явления. Нелинейная поляризация среды. Оценки интенсивности световой волны, при которых наблюдаются нелинейные эффекты. Наведенное двулучепреломление. Генерация второй гармоники, фазовый синхронизм. Оптическое выпрямление. Симметрия среды и генерация второй гармоники. Самофокусировка, критическая мощность самофокусировки, мелкомасштабная самофокусировка.

Понятие о комбинационном рассеянии света и вынужденном рассеянии Мандельштама–Бриллюэна.

14. Распространение электромагнитных волн в световодах. Градиентные световоды и световоды с резким изменением показателя преломления. Допустимая угловая апертура. Типы волн. Одномодовые и многомодовые световоды. Рэлеевское рассеяние как причина затухания световой волны в световодах. Применение для высокоскоростной связи. Область нулевой дисперсии. Ультракороткие импульсы.

Литература

Основная

1. *Сивухин Д.В.* Общий курс физики. Оптика. Т. IV. – Москва : Физматлит, 2018.
2. *Кингсен А.С., Локишин Г.Р., Ольхов О.А.* Основы физики. Т. I, ч. III, гл. 6–11. – Москва : Физматгиз, 2001.
3. *Кириченко Н.А.* Принципы оптики : учебное пособие. – Москва : МФТИ, 2016.
4. *Бутиков Е.И.* Оптика. – Москва : Высшая школа, 1986.
5. *Ахманов С.А., Никитин С.Ю.* Физическая оптика. – Москва : Издательство МГУ, Наука, 2004.

Дополнительная

1. *Горелик Г.С.* Колебания и волны. – Москва : Физматлит, 1959, 2007.
2. *Ландсберг Г.С.* Оптика. – Москва : Физматлит, 2003.
3. *Борн М., Вольф Э.* Основы оптики. – Москва : Наука, 1973.
4. *Козел С.М., Листвин В.И., Локишин Г.Р.* Введение в когерентную оптику и голографию. – Москва : МФТИ, 2000.
5. *Кольер Р.* Оптическая голография. – Москва : Мир, 1973.
6. *Крымский К.М.* Аберрации центрированных оптических систем – теория и расчёт. — Москва : МФТИ, 2015.
7. *Петухов В.А.* Оптические волокна : учебно-метод. пособие. – Москва : МФТИ, 2019.

ЗАДАНИЕ ПО ФИЗИКЕ
для студентов 2-го курса
на весенний семестр 2020/2021 учебного года

Дата	№ сем	Тема семинарских занятий	Задачи		
			0	I	II
01.02–06.02	1	Принцип Ферма. Геометрическая оптика и элементы фотометрии. Оптические инструменты.	1.4 01 02	1.29 1.22 1.9 1.56	1.15 T1 T2 1.57
08.02–13.02	2	Законы отражения, формулы Френеля. Поляризация. Поток энергии и давление света.	01 11.7 2.3	2.5+2.23 2.26 2.29 2.42	2.1 2.20 2.27 2.45
15.02–22.02	3	Дисперсия. Фазовая и групповая скорости.	10.2 10.5 ^(2,3,5) 01	10.8 10.43 10.75 10.77	10.21 10.24 10.35 T3
01.03–06.03	4	Интерференция монохроматических волн.	3.3 01 02	3.5 3.10 3.18 T4	3.16 3.11 3.20 3.35
08.03–13.03	5	Немонохроматический свет, временная когерентность. Пространственная когерентность	01 4.2 5.3 02	4.10 4.11 5.14 5.20	4.9 5.13 5.23 5.30
15.03–20.03	6	Дифракция Френеля. Зонные пластинки.	01 02 6.1	6.15 6.20 6.59 6.43	6.16 6.31 6.50 6.64
22.03–27.03	7	Дифракция Фраунгофера. Разрешающая способность оптических инструментов.	7.5 01 02	7.16 7.48 7.54 7.83	7.10 7.53 7.59 7.33
29.03–04.04	8	Спектральные приборы.	8.2 01 02	8.39 8.19 8.61 8.78	8.37 8.47 T5 T6

05.04– 10.04	9	Контрольная работа (по группам)			
12.04– 17.04	10	Сдача 1-го задания			
19.04– 24.04	11	Дифракция на синусоидальных решётках. Элементы фурье-оптики.	θ_1 θ_2 θ_3	9.1 9.15 9.22 9.26	9.11 9.17 9.28 9.79
26.04– 01.05	12	Голография.	θ_1 θ_2 θ_3	9.32 9.35 9.45 9.52	9.33 9.36 9.40 9.78
27.04– 02.05	13	Поляризация света. Элементы кристаллооптики.	11.17 11.1 11.12	11.9 11.16 11.54 11.28	11.13 11.60 11.80 <i>11.121</i>
03.05– 08.05	14	Рассеяние света. Элементы нелинейной оптики.	θ_1 θ_2 θ_3	<i>11.125</i> 11.89 <i>11.126</i> Т8	11.88 11.90 <i>11.128</i> Т7
10.05– 15.05	15	Сдача 2-го задания.			
17.05– 22.05	16	Зачёт.			

Примечание

Номера задач указаны по «Сборнику задач по общему курсу физики. Ч. 2. Электричество и магнетизм. Оптика / под ред. В. А. Овчинкина (**4-е** изд., испр. и доп.). – Москва : Физматкнига, 2017». *Курсивом отмечены задачи, которые необходимо брать из нового издания.*

Все задачи обязательны для сдачи задания. В каждой теме семинара задачи разбиты на 3 группы:


- 0** — задачи, которые студент должен решать в течение недели для подготовки к семинару;
- I** — задачи, рекомендованные для разбора на семинаре (преподаватель может разбирать на семинарах и другие равноценные задачи по своему выбору);

II — задачи для самостоятельного решения; их решения должны быть оформлены студентами в отдельных тетрадах и сданы преподавателю на проверку.

Задачи группы 0

Семинар 1

⁰1. На рис. показаны положение главной оптической оси тонкой линзы LL' и ход проходящего сквозь нее луча ABC . Найдите построением ход произвольного луча DE за линзой.



⁰2. Положительной линзой с фокусным расстоянием F создается изображение объекта на экране. Какому условию должно удовлетворять расстояние от объекта до экрана, чтобы это было возможно?

Семинар 2

⁰1. Выразить интенсивность плоской электромагнитной волны, распространяющейся в немагнитной среде с показателем преломления n , через амплитуду вектора напряженности электрического поля волны E_0 .

Семинар 3

⁰1. Концентрация электронов в нижних слоях ионосферы равна $N \sim 1,5 \cdot 10^6 \text{ см}^{-3}$. Какие электромагнитные волны будут испытывать отражение при вертикальном радиозондировании ионосферы?

Ответ: $\nu < 10 \text{ МГц}$ ($\lambda > 30 \text{ м}$).

Семинар 4

⁰1. На экран падают две плоские волны с равными амплитудами A под малыми углами $\varphi_{1,2} = \pm 0,01$ рад. Длина волны $\lambda = 500 \text{ нм}$, нормаль к экрану и волновые векторы волн лежат в одной плоскости, см на экране. Определите ширину интерференционных полос (см. рис.).



Ответ: 25 мкм .

⁰2. На тонкую пленку с показателем преломления n падает пучок белого света под углом θ к нормали. При какой минимальной толщине $b_{\text{мин}}$ и в какой цвет будет окрашена пленка в отраженном свете?

Семинар 5

⁰1. В двухлучевом интерференционном опыте используется источник

света с длиной волны $\lambda = 500$ нм и шириной спектра $\Delta\lambda = 10$ нм. Оцените максимально допустимую разность хода лучей Δ_{\max} и максимальное число интерференционных полос m_{\max} , которые можно наблюдать в этом опыте.

Ответ: $\Delta_{\max} \sim 25$ мкм, $m_{\max} \sim 100$.

02. Найдите апертуру интерференции в опыте с бипризмой с преломляющим углом α и показателем преломления n , если источник и плоскость наблюдения расположены на одинаковых расстояниях от бипризмы.

Семинар 6

01. Щель ширины $b = 1$ мм освещается параллельным пучком света с длиной волны $\lambda = 500$ нм. Оцените, на каком расстоянии L от щели необходимо разместить экран, чтобы наблюдать на нём дифракцию Френеля.

Ответ: $L \sim 1$ м.

02. На ирисовую диафрагму с переменным радиусом отверстия, расположенную на расстоянии L от экрана, падает свет с длиной волны λ . Диафрагму постепенно открывают, начиная с $R \approx 0$. При каком радиусе R интенсивность света в центре экрана впервые обратится в ноль?

Семинар 7

01. Через маленькое круглое отверстие проходит монохроматический параллельный пучок света и создает на удаленном экране дифракционную картину Фраунгофера. Во сколько раз изменится освещённость в центре экрана, если увеличить диаметр отверстия вдвое?

Ответ: увеличится в 16 раз.

02. Плоская световая волна дифрагирует на щели с шириной $b = 10\lambda$, где λ — длина волны. Оценить отношение интенсивностей нулевого и первого дифракционных максимумов.

Ответ: $I_1/I_0 \approx 0,05$.

Семинар 8

01. На дифракционную решетку, имеющую период $d = 10$ мкм, нормально падает свет от желтого дублета натрия ($\lambda_1 = 5890$ Å, $\lambda_2 = 5896$ Å). Оцените угловое расстояние между максимумами $\delta\varphi$ во втором порядке ($m = 2$).


Ответ: $\delta\varphi \approx 1,2 \cdot 10^{-4}$ рад.

02. Дифракционная решётка с периодом d имеет размер $D = 10^3 d$ в направлении, перпендикулярном штрихам. Ширина прозрачных штрихов решётки равна половине периода. Определите максимальную разрешающую способность решётки в спектрах 1-го и 2-го порядков.

Ответ: $R_1 = 10^3$, $R_2 = 0$.

Семинар 11

01. Плоская волна с длиной волны λ распространяется в плоскости xz под углом α к оси z . Запишите распределение комплексной амплитуды волны и интенсивности в плоскости $z = 0$. Найдите разность фаз между колебаниями в точках $z = 0$ и $z = L$, лежащих на оси z (см. рис.).



02. Решётка освещается нормально падающей плоской монохроматической волной с амплитудой A . Укажите пространственные частоты и амплитуды плоских волн за дифракционной решёткой, прозрачность которой $\tau(x) = \cos^2(\Omega x)$.

03. Оцените ширину пространственного спектра плоских волн Δk_x при дифракции плоской монохроматической волны на щели шириной b .

Семинар 12

01. Точечный источник с длиной волны λ расположен в начале координат. Пользуясь параболическим приближением, найти распределение комплексной амплитуды и интенсивности в плоскости $x = L$.

02. Голограмму точечного источника, находящегося на расстоянии L от фотопластины, записали по схеме Габора на длине волны λ . Где будут находиться мнимое и действительное изображения, если восстановление голограммы производить светом с длиной волны 2λ ?

03. Почему при получении голографических изображений объёмных объектов практический интерес представляют только мнимые изображения? Поясните ответ с помощью схематического рисунка.

Семинар 14

01. Пользуясь формулой Рэлея, оцените коэффициент пропускания света слоем воздуха толщиной 8 км в атмосфере вблизи поверхности Земли, для двух длин волн: $\lambda = 400$ нм (фиолетовый свет) и 650 нм (красный свет). Показатель преломления воздуха принять равным $n - 1 = 2,9 \cdot 10^{-4}$.

Ответ: $T_{400} \approx 0,7$, $T_{700} \approx 0,95$.

02. Лазерный пучок проходит сквозь слабопоглощающую жидкость (интенсивность пучка максимальна на его оси). Каков знак возникающей в жидкости линзы?

03. Молекулы некоторой жидкости имеют разную поляризуемость по разным осям. Как будут ориентироваться молекулы в поле световой волны: максимальной поляризуемостью по направлению \vec{E} или перпендикулярно \vec{E} ? Ответ обосновать.

Текстовые задачи


T1. а) У некоторого близорукого человека дальняя граница области, в которой он видит предметы резко, находится на расстоянии L_d от глаза. Очки какой оптической силы D ему следует носить, чтобы эта граница переместилась в бесконечность? Провести расчет для $L_d = 0,5$ м.

б) У некоторого дальновзорного человека ближняя граница области, в которой он видит предметы резко, находится на расстоянии L_b от глаза. Очки какой оптической силы ему следует надеть, чтобы эта граница переместилась в «положение наилучшего зрения» $L_0 = 25$ см. Провести расчет для $L_b = 1$ м.

Ответ: а) $D = -2$ дптр, б) $D = +3$ дптр.


T2. Найти тип идеальной формы поверхности плоско-выпуклой линзы для фокусировки параллельного пучка в точку (сфера, гипербола, парабола или др). Линза расположена плоской поверхностью к плоскому волновому фронту.

T3. (2019) Параллельный пучок излучения длиной 100 фс и средней длиной волны $\lambda = 500$ нм фокусируется положительной линзой толщиной $L = 6$ мм в центре и близкой к нулю на краях. Пучок заполняет всю линзу. Показатель преломления материала линзы $n = 1,7$, групповая скорость в стекле $v_{гр} = 0,55c$. Оценить длительность импульса в фокусе линзы.



Ответ: $\tau \approx 2,4$ пс.

T4. (2019) Падающая на бипризму Френеля БФ плоская монохроматическая линейно поляризованная волна создает на плоском экране Э интерференционную картину с шириной полосы Λ . Плоскость падения перпендикулярна плоскости экрана. Поле E волны колеблется параллельно плоскости падения. Длина волны λ . Определите видность V интерференционной картины.




Ответ: $V = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{\lambda}{\Lambda} \right)^2$.

T5. Спектральная линия H_α атомарного водорода ($\lambda = 6563 \text{ \AA}$) имеет тонкую структуру в виде двух «сублиний» в интервале длин волн $\delta\lambda \approx 0,16 \text{ \AA}$. Какой должна быть минимальная база интерферометра Фабри–Перо L с коэффициентом отражения зеркал по интенсивности $\rho = 0,9$, чтобы с его

помощью можно было обнаружить тонкую структуру линии? Определите также для такого интерферометра: дисперсионную область $\Delta\lambda$, направление на ближайший к центру максимум θ_1 и угловую дисперсию $d\theta/d\lambda$ вблизи него. В центре картины – светлое пятно.

Ответ: $L = 0,4$ мм, $\Delta\lambda = 5 \text{ \AA}$, $\theta_1 = 2,3^\circ$, $D = 4 \cdot 10^{-3} \text{ \AA}^{-1}$.

Т6. Современные фотодиоды обеспечивают огромный диапазон линейности, до 11 порядков по интенсивности света, то есть в этом диапазоне фототок линейно зависит от интенсивности света, падающего на фотодиод. Это позволяет измерять очень малые интенсивности модулированных по амплитуде световых сигналов на фоне гораздо более мощной постоянной засветки.



Излучение хорошо стабилизированного непрерывного лазера с длиной волны 0,6 мкм пропускается через интерферометр Майкельсона, в котором одно из зеркал Z_1 может колебаться с малой амплитудой a . Зеркало Z_2 чуть-чуть наклонено, так что в плоскости фотоприемника получают достаточно широкие (больше размера фотоприемника) интерференционные полосы. Смещение зеркала Z_1 приводит к смещению интерференционных полос. Оцените минимальное значение a_{\min} амплитуды колебаний, которое можно измерить данной схемой, если измерительное устройство позволяет обнаружить периодические колебания фототока, составляющие величину 10^{-10} от величины тока в максимуме интерференционной картины. В каком месте интерференционной картины (в максимуме, минимуме интенсивности или в другом месте) следует располагать фотодиод для получения максимальной чувствительности?

Ответ: $a_{\min} \approx 10^{-16}$ см.

Т7. Кристалл ниобата лития обладает сильной нелинейностью и довольно часто используется для генерации второй гармоники. Показатели преломления для обыкновенной и необыкновенной волны этого кристалла сильно зависят от температуры. Для необыкновенной волны $\frac{dn_e}{dT} = 5,4 \cdot 10^{-6} (\text{°C})^{-1}$, а для обыкновенной $\frac{dn_o}{dT} = 37,9 \cdot 10^{-6} (\text{°C})^{-1}$. Оцените, насколько надо изменить температуру кристалла, чтобы интенсивность генерации второй гармоники стала равной нулю. Считайте, что до изменения

температуры было достигнуто условие фазового синхронизма, длина волны накачки равна $\lambda = 1$ мкм, а длина кристалла $l = 1$ см.

Ответ: $\delta T \approx 1.54^\circ\text{C}$.

Т8. Найти пропускание атмосферой солнечного излучения во время восхода. Сделать расчет для красного ($\lambda = 700$ нм) и фиолетового ($\lambda = 400$ нм) цветов. Атмосферу считать изотермической, потери, не связанные с рэлеевским рассеянием (пыль, облака, ...), не учитывать. Показатель преломления атмосферы вблизи поверхности Земли равен $n_0 = 1,0003$.

Ответ: для $\lambda = 400$ нм $I_{\text{кон}}/I_0 = 5,3 \cdot 10^{-6}$, для $\lambda = 700$ нм $I_{\text{кон}}/I_0 = 0,27$.

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2021 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: **Гармонический анализ**
по направлению
подготовки: **01.03.02 «Прикладная математика и информатика»,**
03.03.01 «Прикладные математика и физика»,
16.03.01 «Техническая физика»,
19.03.01 «Биотехнология»,
27.03.03 «Системный анализ и управление»
физтех-школы: **ЛФИ, ФАКТ, ФБМФ, ФРКТ**
кафедра: **высшей математики**
курс: **2**
семестр: **4**

Трудоёмкость:

теор. курс: базовая часть — 3 зач. ед.;

лекций — 30 часов

практические (семинарские)

занятия — 30 часов

лабораторные занятия — нет

Экзамен — 4 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ — 60

Самостоятельная работа:
теор. курс — 45 часов

Программу и задание составили:

д. ф.-м. н., профессор О. В. Бесов

д. ф.-м. н., профессор, С. А. Гриценко

д. ф.-м. н., доцент А. Ю. Петрович

д. ф.-м. н., профессор В. Ж. Сакбаев

к. ф.-м. н., доцент А. И. Тюленев

Программа принята на заседании кафедры
высшей математики 19 ноября 2020 г.

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., профессор

Г. Е. Иванов

1. Абсолютно интегрируемые функции. Лемма Римана. Тригонометрические ряды Фурье для абсолютно интегрируемых функций. Стремление к нулю коэффициентов Фурье. Представление частичной суммы ряда Фурье интегралом с ядром Дирихле. Принцип локализации. Достаточные условия сходимости рядов Фурье в точке. Равномерная сходимость рядов Фурье. Почленное дифференцирование и интегрирование рядов Фурье. Порядок убывания коэффициентов Фурье. *Для потока О. В. Бесова: оценка скорости стремления к нулю остатка тригонометрического ряда Фурье.* Ряд Фурье в комплексной форме.
2. Суммирование рядов Фурье методом средних арифметических. Теоремы Вейерштрасса о приближении непрерывных функций тригонометрическими и алгебраическими многочленами.
3. Метрические и линейные нормированные пространства. Сходимость в метрических пространствах. Полные метрические пространства, полные линейные нормированные (банаховы) пространства. Полнота пространства $C[a, b]$. Неполнота пространств непрерывных на отрезке функций с интегральными нормами. Сравнение норм: сравнение равномерной сходимости, сходимостей в среднем и в среднем квадратичном. Полные системы в линейных нормированных пространствах. *Для потока В. Ж. Сакбаева: пополнение метрического пространства; пополнение линейного нормированного пространства; теорема о пополнении.*
4. Бесконечномерные евклидовы пространства. Ряд Фурье по ортонормированной системе. Минимальное свойство коэффициентов Фурье, неравенство Бесселя. Равенство Парсеваля. Ортонормированный базис в бесконечномерном евклидовом пространстве. Гильбертовы пространства. Необходимое и достаточное условие того, чтобы последовательность чисел являлась последовательностью коэффициентов Фурье элемента гильбертова пространства с фиксированными ортонормированным базисом. Связь понятий полноты и замкнутости ортонормированной системы.
5. Тригонометрические ряды Фурье для функций, абсолютно интегрируемых с квадратом. Полнота тригонометрической системы, равенство Парсеваля. Полнота системы полиномов Лежандра.
6. Собственные интегралы, зависящие от параметра, их свойства. Несобственные интегралы, зависящие от параметра; равномерная сходимость. Критерий Коши равномерной сходимости несобственных интегралов. Признаки Вейерштрасса и Дирихле. Непрерывность, дифференцирование и интегрирование по параметру несобственных интегралов. Применение теории интегралов, зависящих от параметра, к вычислению определенных интегралов. Интегралы Дирихле и Лапласа. Интегралы Эйлера — гамма и бета функции. Выражение бета-функции через гамма-функцию.

7. Интеграл Фурье. Представление функции интегралом Фурье. Преобразование Фурье абсолютно интегрируемой функции и свойства его образа: непрерывность, стремление к нулю на бесконечности. Формулы обращения. Преобразование Фурье производной и производная преобразования Фурье.
8. Пространство основных функций D и пространство обобщенных функций D' . Сходимостъ в пространстве обобщенных функций. Регулярные и сингулярные обобщенные функции. Дельта-функция. Умножение обобщенной функции на бесконечно дифференцируемую. Дифференцирование обобщенных функций.

Литература

Основная

1. *Бесов О. В.* Лекции по математическому анализу. — Москва : Физматлит, 2014, 2015, 2016.
2. *Иванов Г. Е.* Лекции по математическому анализу Ч.2 — Москва : МФТИ, 2011.
3. *Кудрявцев Л. Д.* Курс математического анализа. — 5-е изд. — Москва : Дрофа, 2003.
4. *Петрович А. Ю.* Лекции по математическому анализу. Ч. 3. Кратные интегралы. Гармонический анализ. — Москва : МФТИ, 2018.
5. *Тер-Крикоров А. М., Шабунин М. И.* Курс математического анализа. — Москва : Физматлит, 2003.
6. *Яковлев Г. Н.* Лекции по математическому анализу. Ч. 2, 3. — Москва : Физматлит, 2004.

Дополнительная

7. *Никольский С. М.* Курс математического анализа. Т. 1, 2. — 5-е изд. — Москва : Физматлит, 2000.
8. *Фиштенгольц Г. М.* Курс дифференциального и интегрального исчисления. — 8-е изд. — Москва : Физматлит, 2007.

ЗАДАНИЯ

Литература

1. Сборник задач по математическому анализу. Интегралы. Ряды: учебное пособие/под ред. Л.Д. Кудрявцева. — Москва : Физматлит, 2003. (цитируется — С2)
2. Сборник задач по математическому анализу. Функции нескольких переменных: учебное пособие/под ред. Л.Д. Кудрявцева. — Москва : Физматлит, 2003. (цитируется — С3)

Замечания

1. Задачи с подчёркнутыми номерами рекомендовано разобрать на семинарских занятиях.
2. Задачи, отмеченные *, являются необязательными для всех студентов.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 15–20 марта)

I. Тригонометрические ряды Фурье

С.2. §22: 1(5); 11; 14; 30; 42; 45 В каждом примере постройте график суммы ряда Фурье и исследуйте ряд на равномерную сходимость на \mathbb{R} .

С.2. §22: 23*; 65; 67; 68; 72; 110; 111(4;3).

1. Сходятся ли равномерно ряды Фурье функции $f(x) = e^x$, $x \in [0; \pi/2]$ по системам:

а) $\{\sin(2k-1)x\}_{k=1}^{\infty}$; б) $\{\sin 2kx\}_{k=1}^{\infty}$;

в) $\{\cos(2k-1)x\}_{k=1}^{\infty}$; г) $\{\cos 2kx\}_{k=0}^{\infty}$?

Постройте графики сумм этих рядов.

2. Не вычисляя коэффициентов Фурье, определить порядок их убывания

а) x^{10} ; б) x^5 ; в) $(x^2 - \pi^2)^{10}$; г) $(\pi^2 - x^2) \sin^2 x$.

С.2. §22: 115; 121. С помощью равенства Парсеваля вычислите суммы

рядов: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6}$.

С.2. §16: 47*(2); 48(1; 3).

II. Функциональные пространства

3. Докажите, что если f – функция, непрерывная на отрезке $[a, b]$, а $\{f_n\}$ – последовательность функций, непрерывных на $[a, b]$, то между разными видами сходимости имеются связи, указанные в схеме (при перечеркнутой стрелке привести контрпример):



С.3. §18: 97; 98*.

4. Докажите, что система функций $\{x^n\}_{n=0}^{\infty}$ полна в пространствах $C[a, b]$, $CL_1[a, b]$, $CL_2[a, b]$.

С.3. §19: 116; 126*.

5. Полна ли система функций $\{x, x^3, \dots, x^{2k+1}, \dots\}$ в пространстве: а) $C([1; 2])$; б) в пространстве $C([0; 1])$?

6. Полна ли система $\{\cos(2k-1)x\}_{k=0}^{\infty}$ в пространстве:

- а) $C[0; \pi/2]$; б) $C[0; 2]$?

30 + 4*

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 10–15 мая)

I. Собственные интегралы, зависящие от параметра

С.3. §13: 2(5); 14(2); 17; 18*(2).

§15: 1(3).

II. Несобственные интегралы, зависящие от параметра

С.3. §14: 1(1) — исследовать также при $\alpha \in (1; +\infty)$.

1(2) — исследовать также при $\alpha \in (0; 1)$

С.3. §14: 6(3, 4); 7(3, 5, 6); 8(2).

1. Вычислите интегралы Дирихле и Лапласа:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx, \quad \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax}{1+x^2} dx, \quad \int_0^{+\infty} \frac{x \sin ax}{1+x^2} dx.$$

С.3. §15: 1(4); 2(4); 3(2); 5(2); 6(1, 4, 5); 13(4); 15(4).

С.3. §16: 7(4); 9(3); 12(9); 10*(3).

III. Интеграл Фурье. Преобразование Фурье

С.2. §12: 248; 254.

С.3. §17: 1(3); 2(4); 5(2); 6(1); 7(4); 8(1,5); 14(1,3); 17*(1).

IV. Обобщенные функции

С.3. §21: 58*; 60.

2. Докажите, что в D' справедливы равенства:

а) $\lim_{a \rightarrow +0} \frac{a}{a^2 + x^2} = \pi \delta(x)$; б) $\lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{x} \sin \frac{x}{a} = \pi \delta(x)$.

С.3. §21: 71; 75*; 77*; 84.

3. Найдите в D'

$$\lim_{\xi \rightarrow +0} \frac{x\xi}{(x^2 + \xi^2)^2}.$$

4. Упростите в D' выражения:

а) $(e^{\sin x} + x \cos x) \delta(x)$; б) $\left(\frac{\sin x}{1+x^2} - \operatorname{ch} x \right) \delta'(x)$; в) $e^{x^2} \delta''(x)$.

45 + 6*

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2021 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: Дифференциальные уравнения

по направлению

подготовки:

01.03.02 «Прикладная математика и информатика»,
03.03.01 «Прикладные математика и физика»,
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
16.03.01 «Техническая физика»,
27.03.03 «Системный анализ и управление»

физтех-школы: для всех физтех-школ

кафедра: высшей математики

курс: 2

семестр: 4

Трудоёмкость:

теор. курс: базовая часть — 4 зачет. ед.;

лекции — 30 часов

практические (семинарские)

занятия — 30 часов

лабораторные занятия — нет

Экзамен — 4 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ — 60

Самостоятельная работа:

теор. курс — 90 часов

Программу и задание составили:

д. ф.-м. н., профессор А. М. Бишаев

д. т. н., профессор А. Е. Умнов

д. ф.-м. н., профессор С. Е. Жуковский

к. ф.-м. н., доцент В. Ю. Дубинская

к. ф.-м. н., доцент А. Ю. Семенов

к. ф.-м. н., доцент О. А. Пыркова

Программа принята на заседании кафедры
высшей математики 19 ноября 2020 г.

Заведующий кафедрой

д. ф.-м. н., профессор

Г. Е. Иванов

- 1. Основные понятия, простейшие типы дифференциальных уравнений.** Основные понятия. Простейшие типы уравнений первого порядка: уравнения с разделяющимися переменными, однородные, линейные, уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. Уравнение Бернулли или Риккати. Метод введения параметра для уравнения первого порядка, не разрешенного относительно производной. Методы понижения порядка дифференциальных уравнений. Использование однопараметрических групп преобразований для понижения порядка дифференциальных уравнений (по усмотрению лектора).
- 2. Линейные дифференциальные уравнения и линейные системы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.** Формула общего решения линейного однородного уравнения n -го порядка. Отыскание решения линейного неоднородного уравнения в случае, когда правая часть уравнения является квазимногочленом. Уравнение Эйлера.
Формула общего решения линейной однородной системы уравнений в случае простых собственных значений матрицы коэффициентов системы. Теорема о приведении матрицы линейного преобразования к жордановой форме (без доказательства). Формула общего решения линейной однородной системы в случае кратных собственных значений матрицы коэффициентов системы. Отыскание решения линейной неоднородной системы уравнений в случае, когда свободные члены уравнения являются квазимногочленами (без доказательства).
Матричная экспонента и ее использование для получения формулы общего решения и решения задачи Коши для линейных однородных и неоднородных систем уравнений. Преобразование Лапласа и его применение для решения линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами (по усмотрению лектора). Исследование краевых задач для линейных уравнений второго порядка при наличии малого параметра при старшей производной (по усмотрению лектора).
- 3. Элементы вариационного исчисления.** Основные понятия. Простейшая задача вариационного исчисления. Задача со свободными концами, задача для функционалов, зависящих от нескольких неизвестных функций, и задача для функционалов, содержащих производные высших порядков. Условный экстремум: изопериметрическая задача, задача Лагранжа (без доказательства).
- 4. Задача Коши.** Теорема существования и единственности решения задачи Коши для нормальной системы дифференциальных уравнений и для уравнения n -го порядка в нормальном виде. Теоремы о продолжении решения. Характер зависимости решения задачи Коши от параметров

и начальных данных: непрерывность, дифференцируемость (без доказательства). Задача Коши для уравнений первого порядка, не разрешенных относительно производной. Особое решение.

5. **Автономные системы дифференциальных уравнений.** Основные понятия и свойства фазовых траекторий. Классификация положений равновесия линейных автономных систем уравнений второго порядка. Характер поведения фазовых траекторий в окрестности положения равновесия двумерных автономных нелинейных систем уравнений. Устойчивость и асимптотическая устойчивость положения равновесия автономной системы. Достаточные условия асимптотической устойчивости.

6. **Первые интегралы и линейные однородные уравнения в частных производных первого порядка.** Первые интегралы систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Критерий первого интеграла. Теорема о числе независимых первых интегралов.

Формула общего решения линейного однородного уравнения в частных производных первого порядка. Постановка задачи Коши для таких уравнений. Теорема существования и единственности решения задачи Коши.

7. **Линейные дифференциальные уравнения и линейные системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами.** Теорема существования и единственности решения задачи Коши для нормальных линейных систем уравнений и для линейного уравнения n -го порядка в нормальном виде.

Фундаментальная система и фундаментальная матрица решений линейной однородной системы уравнений. Структура общего решения линейной однородной и неоднородной системы уравнений. Определитель Вронского. Формула Лиувилля–Остроградского. Метод вариации постоянных или формула Коши для линейной неоднородной системы уравнений. Следствия для линейных уравнений n -го порядка. Теорема Штурма и следствия из нее.

Уравнение Бесселя и некоторые свойства его решений (по усмотрению лектора). Асимптотическое поведение решений при больших значениях аргумента (по усмотрению лектора).

Литература

Основная

1. *Понтрягин Л. С.* Обыкновенные дифференциальные уравнения. — Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, 2001.
2. *Филиппов А. Ф.* Введение в теорию дифференциальных уравнений. — Москва : УрСС, 2004, 2007; — Москва : КомКнига, 2007, 2010, <http://bookfi.org/book/791964>.
3. *Степанов В. В.* Курс дифференциальных уравнений. — Москва : ЛКИ, 2008.

4. Романко В. К. Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления. — Москва : Лаборатория базовых знаний, 2000–2011.
5. Федорюк М. В. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — Санкт-Петербург : Лань, 2003.
6. Умнов А. Е., Умнов Е. А. Основы теории обыкновенных дифференциальных уравнений. — Москва : МФТИ, 2016, <http://www.umnov.ru>.

Дополнительная

7. Гельфанд И. М., Фомин С. В. Вариационное исчисление. — Москва : Физматгиз, 1961, <http://techlibrary.ru/bookpage.htm>.
8. Петровский И. Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. — УрСС, 2003; — Москва : Физматлит, 2009.
9. Тихонов А. Н., Васильева А. Б., Свешников А. Г. Дифференциальные уравнения. — Москва : Физматгиз, 1985.
10. Куццов Л. П., Николаев В. С. Курс лекций по теории обыкновенных дифференциальных уравнений: учебное пособие. — Москва : МФТИ, 2003.
11. Ипатов В. М., Пыркова О. А., Седов В. Н. Дифференциальные уравнения. Методы решений. — Москва : МФТИ, 2007, 2012.

ЗАДАНИЯ

Литература

1. Сборник задач по дифференциальным уравнениям и вариационному исчислению /под ред. Романко В. К.. — Москва : Физматлит, 2003. (цитируется — С)
2. Филиппов А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. — Москва : Ижевск : 2005; — Москва : МГУ, 2011; — Москва : ЛКИ, 2008. (цитируется — Ф)

Замечания

1. Задачи с подчёркнутыми номерами рекомендовано разобрать на семинарских занятиях.
2. Задачи, отмеченные *, являются необязательными для всех студентов.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 15–20 марта)

I. Задача Коши

С. §5: 26; 28а.

С. §6: 36; 49.

Ф.: 1065; 1066; 1067*.

1. Доказать, что при $\alpha > 0$ любое решение уравнения $y' = |y|^\alpha$ не может быть продолжено на бесконечный интервал $(-\infty; +\infty)$.

2. Рассмотреть уравнение $y'' - (y + 1)y' + y = 0$. Показать, что прямая $y = 1$ является дискриминантным множеством для этого уравнения, но не является решением. Показать, что через каждую точку прямой $y = 1$ проходят две интегральные кривые уравнения, имеющие общую касательную. Решить краевую задачу:
 $y'' - (y + 1)y' + y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(2) = e$. Изобразить график полученного решения.

II. Линейные уравнения с переменными коэффициентами

Ф.: 649; 664; 667; 668*; 673; 678.

Ф. §22: 47*; 59.

С. §9: 10; 31; 53; 64; 68(a).

3. Доказать, что уравнение Бесселя $x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$, где $\nu = \text{const}$ на $(0; \infty)$, не может иметь двух линейно независимых решений, ограниченных в окрестности нуля вместе со своими первыми производными.

III. Теорема Штурма

Ф.: 723; 725*; 726.

С. §10: 2; 3; 6.

4. Доказать, что любое нетривиальное решение уравнения $y'' - 2xy' + y = 0$ на интервале $(-\infty; +\infty)$ имеет не более трех нулей.
5. Доказать, что:

а) любое нетривиальное решение уравнения Бесселя

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0, \quad \nu = \text{const}$$

имеет бесконечное число нулей на промежутке $(0, +\infty)$;

- б)* расстояние между последовательными нулями $|x_{n+1} - x_n|$ любого указанного выше решения стремится к π при $n \rightarrow +\infty$.

IV. Исследование поведения фазовых траекторий

Во всех задачах для фокусов и узлов определить, являются ли они устойчивыми или неустойчивыми.

Ф.: 964; 972*; 973; 974; 975; 978*.

С. §13: 9; 15; 39; 44; 45.

35+7*

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 3–8 мая)

I. Первые интегралы и их использование для решений автономных систем

С. §14: 12.

Ф.: 1149.

1. Найти первые интегралы уравнений. Используя их, исследовать поведение траекторий на фазовой плоскости.

а) $\ddot{x} + \sin x = 0$; б) $\ddot{x} - x + x^2 = 0$.

С. §16: 5; 26.

II. Линейные однородные уравнения в частных производных первого порядка

С. §17: 5; 16; 22; 79; 83.

2. В области $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$ найти все решения уравнения

$$(x^2 + y^2) \frac{\partial u}{\partial x} + 2xy \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{x^3 - xy^2}{z} \frac{\partial u}{\partial z} = 0$$

и решить задачу Коши $u = z^2$ при $y^2 - x^2 = 1$.

III. Вариационное исчисление

С. §19: 21; 45; 72; 105.

3. Исследовать на экстремум функционал, определив знаки приращения

$$\int_1^2 \left(\frac{2yy'}{x} - 7\frac{y^2}{x^2} - (y')^2 - 12\frac{y}{x} \right) dx, \quad y(1) = 3, \quad y(2) = 1.$$

С. §20.1: 9; 12.

4. Исследовать на экстремум функционал, определив знаки приращения

$$\int_1^2 (2y + yy' + x(y')) dx, \quad y(1) = 1.$$

С. §20.2: 5.

С. §20.3: 2.

С. §21: 1.

5*. Среди всех кривых на цилиндре $x^2 + y^2 = 1$, соединяющих точки $(1, 0, 0)$ и $(0, 1, 1)$ найти кривую наименьшей длины (геодезическую кривую).

23+1*

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2021 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: Дифференциальные уравнения
по направлению: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»,
подготовки: 19.03.01 «Биотехнология»
физтех-школы: ФБМФ, ФАКТ
кафедра: высшей математики
курс: 2
семестр: 4

Трудоёмкость:

теор. курс: базовая часть — 3 зачет. ед.;

лекции — 30 часов

практические (семинарские)

занятия — 30 часов

лабораторные занятия — нет

Экзамен — 4 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ — 60

Самостоятельная работа:
теор. курс — 45 часов

Программу и задание составили:

д. ф.-м. н., профессор А. М. Бишаев

д. т. н., профессор А. Е. Умнов

д. ф.-м. н., профессор С. Е. Жуковский

к. ф.-м. н., доцент В. Ю. Дубинская

к. ф.-м. н., доцент А. Ю. Семенов

к. ф.-м. н., доцент О. А. Пыркова

Программа принята на заседании кафедры
высшей математики 19 ноября 2020 г.

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., профессор

Г. Е. Иванов

- 1. Основные понятия, простейшие типы дифференциальных уравнений.** Основные понятия. Простейшие типы уравнений первого порядка: уравнения с разделяющимися переменными, однородные, линейные, уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. Уравнение Бернулли или Риккати. Метод введения параметра для уравнения первого порядка, не разрешенного относительно производной. Методы понижения порядка дифференциальных уравнений. Использование однопараметрических групп преобразований для понижения порядка дифференциальных уравнений (по усмотрению лектора).
- 2. Линейные дифференциальные уравнения и линейные системы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.** Формула общего решения линейного однородного уравнения n -го порядка. Отыскание решения линейного неоднородного уравнения в случае, когда правая часть уравнения является квазимногочленом. Уравнение Эйлера.
Формула общего решения линейной однородной системы уравнений в случае простых собственных значений матрицы коэффициентов системы. Теорема о приведении матрицы линейного преобразования к жордановой форме (без доказательства). Формула общего решения линейной однородной системы в случае кратных собственных значений матрицы коэффициентов системы. Отыскание решения линейной неоднородной системы уравнений в случае, когда свободные члены уравнения являются квазимногочленами (без доказательства).
Матричная экспонента и ее использование для получения формулы общего решения и решения задачи Коши для линейных однородных и неоднородных систем уравнений. Преобразование Лапласа и его применение для решения линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами (по усмотрению лектора). Исследование краевых задач для линейных уравнений второго порядка при наличии малого параметра при старшей производной (по усмотрению лектора).
- 3. Элементы вариационного исчисления.** Основные понятия. Простейшая задача вариационного исчисления. Задача со свободными концами, задача для функционалов, зависящих от нескольких неизвестных функций, и задача для функционалов, содержащих производные высших порядков. Условный экстремум: изопериметрическая задача, задача Лагранжа (без доказательства).
- 4. Задача Коши.** Теорема существования и единственности решения задачи Коши для нормальной системы дифференциальных уравнений и для уравнения n -го порядка в нормальном виде. Теоремы о продолжении решения. Характер зависимости решения задачи Коши от параметров

и начальных данных: непрерывность, дифференцируемость (без доказательства). Задача Коши для уравнений первого порядка, не разрешенных относительно производной. Особое решение.

5. **Автономные системы дифференциальных уравнений.** Основные понятия и свойства фазовых траекторий. Классификация положений равновесия линейных автономных систем уравнений второго порядка. Характер поведения фазовых траекторий в окрестности положения равновесия двумерных автономных нелинейных систем уравнений. Устойчивость и асимптотическая устойчивость положения равновесия автономной системы. Достаточные условия асимптотической устойчивости.

6. **Первые интегралы и линейные однородные уравнения в частных производных первого порядка.** Первые интегралы систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Критерий первого интеграла. Теорема о числе независимых первых интегралов.

Формула общего решения линейного однородного уравнения в частных производных первого порядка. Постановка задачи Коши для таких уравнений. Теорема существования и единственности решения задачи Коши.

7. **Линейные дифференциальные уравнения и линейные системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами.** Теорема существования и единственности решения задачи Коши для нормальных линейных систем уравнений и для линейного уравнения n -го порядка в нормальном виде.

Фундаментальная система и фундаментальная матрица решений линейной однородной системы уравнений. Структура общего решения линейной однородной и неоднородной системы уравнений. Определитель Вронского. Формула Лиувилля–Остроградского. Метод вариации постоянных или формула Коши для линейной неоднородной системы уравнений. Следствия для линейных уравнений n -го порядка. Теорема Штурма и следствия из нее.

Уравнение Бесселя и некоторые свойства его решений (по усмотрению лектора). Асимптотическое поведение решений при больших значениях аргумента (по усмотрению лектора).

Литература

Основная

1. *Понтрягин Л. С.* Обыкновенные дифференциальные уравнения. — Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, 2001.
2. *Филиппов А. Ф.* Введение в теорию дифференциальных уравнений. — Москва : УрСС, 2004, 2007; — Москва : КомКнига, 2007, 2010, <http://bookfi.org/book/791964>.
3. *Степанов В. В.* Курс дифференциальных уравнений. — Москва : ЛКИ, 2008.

4. Романко В. К. Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления. — Москва : Лаборатория базовых знаний, 2000–2011.
5. Федорюк М. В. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — Санкт-Петербург : Лань, 2003.
6. Умнов А. Е., Умнов Е. А. Основы теории обыкновенных дифференциальных уравнений. — Москва : МФТИ, 2016, <http://www.umnov.ru>.

Дополнительная

7. Гельфанд И. М., Фомин С. В. Вариационное исчисление. — Москва : Физматгиз, 1961, <http://techlibrary.ru/bookpage.htm>.
8. Петровский И. Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. — УрСС, 2003; — Москва : Физматлит, 2009.
9. Тихонов А. Н., Васильева А. Б., Свешников А. Г. Дифференциальные уравнения. — Москва : Физматгиз, 1985.
10. Куццов Л. П., Николаев В. С. Курс лекций по теории обыкновенных дифференциальных уравнений: учебное пособие. — Москва : МФТИ, 2003.
11. Ипатова В. М., Пыркова О. А., Седов В. Н. Дифференциальные уравнения. Методы решений. — Москва : МФТИ, 2007, 2012.

ЗАДАНИЯ

Литература

1. Сборник задач по дифференциальным уравнениям и вариационному исчислению /под ред. Романко В. К.. — Москва : Физматлит, 2003. (цитируется — С)
2. Филиппов А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. — Москва : Ижевск : 2005; — Москва : МГУ, 2011; — Москва : ЛКИ, 2008. (цитируется — Ф)

Замечания

1. Задачи с подчёркнутыми номерами рекомендовано разобрать на семинарских занятиях.
2. Задачи, отмеченные *, являются необязательными для всех студентов.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 15–20 марта)

I. Задача Коши

С. §5: 26; 28а.

С. §6: 36; 49.

Ф.: 1065; 1066; 1067*.

1. Доказать, что при $\alpha > 0$ любое решение уравнения $y' = |y|^\alpha$ не может быть продолжено на бесконечный интервал $(-\infty; +\infty)$.

2. Рассмотреть уравнение $y'^2 - (y + 1)y' + y = 0$. Показать, что прямая $y = 1$ является дискриминантным множеством для этого уравнения, но не является решением. Показать, что через каждую точку прямой $y = 1$ проходят две интегральные кривые уравнения, имеющие общую касательную. Решить краевую задачу:
 $y'^2 - (y + 1)y' + y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(2) = e$. Изобразить график полученного решения.

II. Линейные уравнения с переменными коэффициентами

Ф.: 649; 664; 667; 668*; 673; 678.

Ф. §22: 47*; 59.

С. §9: 10; 31; 53; 64; 68(a).

3. Доказать, что уравнение Бесселя $x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$, где $\nu = \text{const}$ на $(0; \infty)$, не может иметь двух линейно независимых решений, ограниченных в окрестности нуля вместе со своими первыми производными.

III. Теорема Штурма

Ф.: 723; 725*; 726.

С. §10: 2; 3; 6.

4. Доказать, что любое нетривиальное решение уравнения $y'' - 2xy' + y = 0$ на интервале $(-\infty; +\infty)$ имеет не более трех нулей.
5. Доказать, что:

а) любое нетривиальное решение уравнения Бесселя

$$x^2y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0, \quad \nu = \text{const}$$

имеет бесконечное число нулей на промежутке $(0, +\infty)$;

- б)* расстояние между последовательными нулями $|x_{n+1} - x_n|$ любого указанного выше решения стремится к π при $n \rightarrow +\infty$.

IV. Исследование поведения фазовых траекторий

Во всех задачах для фокусов и узлов определить, являются ли они устойчивыми или неустойчивыми.

Ф.: 964; 972*; 973; 974; 975; 978*.

С. §13: 9; 15; 39; 44; 45.

35+7*

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 3–8 мая)

I. Первые интегралы и их использование для решений автономных систем

С. §14: 12.

Ф.: 1149.

1. Найти первые интегралы уравнений. Используя их, исследовать поведение траекторий на фазовой плоскости.

а) $\ddot{x} + \sin x = 0$; б) $\ddot{x} - x + x^2 = 0$.

С. §16: 5; 26.

II. Линейные однородные уравнения в частных производных первого порядка

С. §17: 5; 16; 22; 79; 83.

2. В области $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$ найти все решения уравнения

$$(x^2 + y^2) \frac{\partial u}{\partial x} + 2xy \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{x^3 - xy^2}{z} \frac{\partial u}{\partial z} = 0$$

и решить задачу Коши $u = z^2$ при $y^2 - x^2 = 1$.

III. Вариационное исчисление

С. §19: 21; 45; 72; 105.

3. Исследовать на экстремум функционал, определив знаки приращения

$$\int_1^2 \left(\frac{2yy'}{x} - 7\frac{y^2}{x^2} - (y')^2 - 12\frac{y}{x} \right) dx, \quad y(1) = 3, \quad y(2) = 1.$$

С. §20.1: 9; 12.

4. Исследовать на экстремум функционал, определив знаки приращения

$$\int_1^2 (2y + yy' + x(y')) dx, \quad y(1) = 1.$$

С. §20.2: 5.

С. §20.3: 2.

С. §21: 1.

5*. Среди всех кривых на цилиндре $x^2 + y^2 = 1$, соединяющих точки $(1, 0, 0)$ и $(0, 1, 1)$ найти кривую наименьшей длины (геодезическую кривую).

23+1*

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2021 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: Теория вероятностей
по направлению подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»
физтех-школа: ФАКТ
кафедра: высшей математики
курс: 2
семестр: 4

Трудоёмкость:
теор. курс: базовая часть — 3 зачет. ед.;
лекции — 30 часов
практические (семинарские)
занятия — 30 часов
лабораторные занятия — нет

Диф. зачёт — 4 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ — 60

Самостоятельная работа:
теор. курс — 75 часов

Программу и задание составил
к. ф.-м. н., доцент С. Д. Животов

Программа принята на заседании кафедры
высшей математики 19 ноября 2020 г.

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., профессор

Г. Е. Иванов

1. Случайные события. Алгебра событий, σ -алгебра. Достоверное, невозможное, противоположное, несовместное события.
2. Аксиоматика Колмогорова.
3. Классическое определение вероятности. Геометрическая вероятность. Статистическая интерпретация вероятности.
4. Теорема сложения вероятностей.
5. Условная вероятность. Независимые события. Теорема умножения.
6. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
7. Последовательность независимых испытаний. Схема Бернулли, полиномиальная схема. Предельные теоремы для схемы Бернулли: локальная теорема Муавра–Лапласа, теорема Пуассона.
8. Цепи Маркова: основные понятия и свойства. Эргодическая теорема.
9. Случайные величины. Функция распределения, ее свойства.
10. Случайные векторы. Функция распределения, ее свойства.
11. Основные распределения: биномиальное, Пуассона, равномерное, нормальное (одномерное и многомерное).
12. Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание, его свойства. Ковариационная матрица, ее свойства. Моменты и их свойства. Энтропия. Уравнение линейной регрессии.
13. Функции случайного аргумента. Метод линеаризации.
14. Последовательности случайных величин, сходимость по вероятности и сходимость по распределению.
15. Неравенство Маркова. Неравенство Чебышёва. Неравенство Чернова. Закон больших чисел (Маркова, Чебышёва, Хинчина, Бернулли).
16. Характеристическая функция и ее свойства.
17. Центральная предельная теорема. Интегральная теорема Муавра–Лапласа.

Литература

1. *Чистяков В. П.* Курс теории вероятностей. — Санкт Петербург : Лань, 2003.
2. *Зубков А. М., Севастьянов Б. А., Чистяков В. П.* Сборник задач по теории вероятностей. — Москва : Наука, 1989.
3. *Гнеденко Б. В.* Курс теории вероятностей. — 6-е изд. — Москва : Наука, 1988.
4. *Крылов В. Ю.* Краткий курс теории вероятностей. — Москва : МФТИ, 1975.
5. *Боровков А. А.* Теория вероятностей. — 6-е изд. — Москва : Наука, 1986.
6. *Колмогоров А. Н.* Основные понятия теории вероятностей. — 2-е изд. — Москва : Наука, 1974.
7. *Феллер В. М.* Введение в теорию вероятностей и её приложения. Т.1. — Москва : Мир, 1984.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ


(срок сдачи 15–20 марта)

I. Комбинация событий. Вероятностное пространство. Классическое определение вероятности. Геометрическая вероятность

- Пусть A , B и C – произвольные события. Найти выражения для событий, состоящих в том, что из A , B и C :
 - произошли A и C , но B не произошло;
 - произошло хотя бы одно из этих событий;
 - произошло два и только два события;
 - ни одно событие не произошло;
 - произошло не более одного события.
- Колода игральных карт (36 листов, 4 масти по 9 карт в каждой) тщательно перетасована. Наудачу берут 6 карт (без возвращения). Описать вероятностное пространство, а также найти вероятность того, что среди этих карт:
 - окажется король пик;
 - окажутся представители всех мастей;
 - будет ровно 4 карты одной масти.
- Монета бросается до тех пор, пока два раза подряд она не выпадет одной и той же стороной. Каждому возможному исходу, требующему n бросаний, припишем вероятность 2^{-n} . Опишите вероятностное пространство и найдите вероятности следующих событий:
 - опыт окончится до седьмого бросания;
 - потребуется четное число бросаний.
- В n конвертов разложено по одному письму n адресатам. На каждом конверте наудачу написан один из n адресов. Найти вероятность p_n того, что хотя бы три письма отправятся по назначению. Вычислить предел p_n при $n \rightarrow \infty$.
- Определить вероятность того, что корни квадратного уравнения $x^2 + 2ax + b = 0$ вещественны, если равновозможны значения коэффициентов в квадрате $|a| \leq 1$, $|b| \leq 1$. Какова вероятность того, что при указанных условиях корни уравнения будут положительны?
- На плоскость, разлинованную параллельными линиями, расстояние между которыми L , бросают иглу длины $l \leq L$. Опишите вероятностное пространство. Какова вероятность того, что игла пересечет линию?

II. Условная вероятность. Независимые события. Последовательность независимых испытаний. Формула полной вероятности. Цепи Маркова

7. На шахматную доску наудачу ставят две ладьи. Событие A – ладьи попали на клетки разного цвета, событие B – ладьи побьют друг друга. Вычислить условные вероятности $P(A|B)$ и $P(B|A)$.
8. Два студента бросают монету и записывают результаты бросков. Первый выигрывает при появлении серии ГГР, второй при появлении серии РГГ. Найти вероятность выигрыша второго игрока, т.е. определить вероятность того, что серия РГГ появится раньше серии ГГР.
9. Рассматривается электрическая цепь, составленная из лампочек по следующей схеме:



Каждая из ламп независимо друг от друга перегорает с вероятностью p . Какова вероятность того, что вся цепь перегорит? Какова условная вероятность того, что лампочка 2 перегорела, если вся цепь перегорела? Какова условная вероятность того, что лампочка 3 перегорела, если известно, что вся цепь перегорела, а лампочка 2 не перегорела?

10. Урна содержит 5 белых и 6 черных шаров. Наудачу извлекается шар, после чего он возвращается в урну вместе с 3 шарами противоположного цвета. Обозначим $A_i, i = 1, 2$, событие, состоящее в том, что при i -м извлечении (без возвращения) шаров из этой урны будет отмечен белый шар. Найти вероятности:
 а) $P(A_i), i = 1, 2$; б) $P(A_1|A_2)$; в) $P(\bar{A}_1 A_2)$.
11. Горнолыжник спускается с горы по трассе, которая имеет n поворотов. С вероятностью p он падает на каждом повороте независимо от падений на других поворотах. Определить вероятность того, что:
 а) k -не падение будет на m -м повороте;
 б) за время спуска горнолыжник упадет не более 3 раз.
12. В круг вписан равносторонний треугольник, в который вписан круг. На эту область наудачу бросают 5 точек. Какова вероятность того, что ровно три точки попадут во внутренний круг, а в область вне треугольника попадет хотя бы одна точка.


13. Одинаковы ли шансы на успех у трех человек, если первому надо получить хотя бы одну шестерку при бросании игральной кости 6 раз, второму – не менее двух шестерок при 12 бросках, а третьему – не менее трех шестерок при 18 бросках?

14. В одном учебном заведении обучаются 100 студентов. День рождения наудачу выбранного студента приходится на определенный день года с вероятностью $1/365$ для каждого из 365 дней. Найти:

- вероятность того, что найдутся ровно два студента, имеющие день рождения 1 апреля;
- вероятность того, что найдутся хотя бы два студента, имеющие день рождения 1 апреля.

Провести все расчеты по биномиальному закону распределения, по локальной теореме Муавра–Лапласа и по теореме Пуассона. Сравнить результаты.

15. Найти предельное распределение системы, если её начальное состояние $(1,0,0,0)$, $(0,1,0,0)$ для случая а) и $(1,0,0)$, $(0,1,0)$ для случая б).



16. На основании многолетних наблюдений за мартовской погодой выявлены следующие закономерности:

- никогда не бывает двух ясных дней подряд;
- если сегодня ясно, то завтра с одинаковой вероятностью пойдет дождь или снег;
- если сегодня снег (или дождь), то с вероятностью $\frac{1}{2}$ погода не изменится, если все же она изменится, то в половине случаев снег заменяется дождем или наоборот, и лишь в половине случаев на следующий день будет ясная погода.

Найти вероятность ясной погоды через три дня после дождя. Найти вероятность того, что первый дождь будет 8 марта, если 1 марта ясно. Найти предельное распределение системы.

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 10–15 мая)

I. Случайные величины. Случайные векторы. Функции от случайных величин

- Пусть случайная величина ξ имеет функцию распределения $F(x)$. Найти функции распределения следующих случайных величин:
а) $2 - 4\xi$; б) $\xi^4 + 6$; в) $1/(\xi + 1)^2 (\xi \neq -1)$.
- Система случайных величин (ξ, η) имеет плотность распределения $\rho(x, y)$. Найти функции распределения и плотности распределения следующих случайных величин:
а) $\zeta = \xi + 3\eta$, б) $\zeta = \xi^2/\eta$.
- Найти плотность распределения частного ξ/η и суммы $\xi + \eta$, если случайные величины независимы и имеют:
а) равномерное распределение на отрезке $[1, 2]$;
б) стандартное нормальное распределение ($a = 0, \sigma = 1$).
- Случайный вектор (ξ, η) имеет нормальное распределение с вектором средних $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ и ковариационной матрицей $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Найти вероятность попадания вектора в область $x^2 + y^2 - x + y + xy < 1$.
- Лягушка совершает два прыжка, каждый — на метр. Направление прыжков выбирается наугад. В качестве случайной величины возьмем расстояние между начальным положением лягушки и конечным положением. Найти плотность распределения, математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины. Построить график функции распределения.
- Двумерное распределение случайных величин ξ и η задается с помощью таблицы

$\eta \setminus \xi$	-1	0	2
-1	1/5	0	1/5
1	0	1/5	1/5
2	1/10	1/10	0

Выяснить, зависимы или нет случайные величины ξ и η . Найти:

- $M\xi, M\eta, D\xi, D\eta, \text{cov}(\xi, \eta)$, коэффициент корреляции и ковариационную матрицу;

- б) закон распределения и функцию распределения произведения $\xi\eta$;
 в) уравнение линейной регрессии.
7. Плотность совместного распределения $p(x, y)$ величин ξ и η определяется равенствами $p(x, y) = c(x + y)$ при $0 \leq x \leq 1$ и $0 \leq y \leq 1$ и $p(x, y) = 0$ в остальных случаях. Найти:
- а) постоянную c ;
 б) плотности распределения ξ и η ;
 в) $M\xi, M\eta, D\xi, D\eta, \text{cov}(\xi, \eta)$, коэффициент корреляции и ковариационную матрицу;
 г) плотность распределения и построить функцию распределения $\min(\xi, \eta)$;
 д) уравнение линейной регрессии.

II. Характеристические функции. Закон больших чисел. Пределные теоремы

8. Найдите законы распределения, которым соответствуют следующие характеристические функции:
 а) $e^{-it} \cos^3 3t$; б) $2(1 - \cos t)/t^2$.
9. Вычислите характеристические функции для следующих законов распределения:

- а) распределения Коши: $p(x) = \frac{1}{\pi(1 + x^2)}$, $(-\infty < x < \infty)$;
 б) нормального распределения с параметром $a = 0$.

Для всех вариантов определить характеристическую функцию и закон распределения случайной величины $\eta = \left(\sum_{k=1}^n \xi_k \right) / n$ в предположении о независимости ξ_k .

10. Студент получает на экзамене 5 с вероятностью 0.1; 4 – с вероятностью 0.4; 3 – с вероятностью 0.3 и 2 – с вероятностью 0.2. За время обучения он сдает 40 экзаменов. Найти симметричные пределы, в которых с вероятностью, близкой к 0.94, лежит средний балл студента:
- а) с помощью неравенства Чебышёва;
 б) с помощью центральной предельной теоремы.

11. Оценить вероятность, что при 4500 подбрасываниях игральной кости цифра 6 выпадет не менее чем 680 раз и не более чем 730 раз. Определить точность оценки.

- 12.** Последовательность независимых случайных величин $\{\xi_n\}$ задана законом распределения: ξ_n принимает значения $n, -n$ и 0 с вероятностями $\frac{1}{4^n}, \frac{1}{4^n}$ и $1 - \frac{2}{4^n}$ соответственно. Выполнен ли ЗБЧ для этой последовательности?
- 13.** Случайные величины ξ_k независимы и имеют показательное распределение с параметром $\lambda = 2$ ($p(x) = 2e^{-2x}, x > 0$). Найти пределы по вероятности при $n \rightarrow \infty$ последовательностей $\left\{ \frac{e^{\xi_1} + e^{\xi_2} + \dots + e^{\xi_n}}{n} \right\}$ и $\left\{ e^{\left(\frac{\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n}{n} \right)} \right\}$.
- 14.** Случайные величины ξ_k независимы и одинаково распределены с плотностью $p(x) = (1 - \cos x)/\pi x^2, (-\infty < x < \infty)$. Найти предельное (при $n \rightarrow \infty$) распределение случайной величины $\eta = \left(\sum_{k=1}^n \xi_k \right) / n$.
- 15.** Случайные величины ξ_k независимы и равномерно распределены на интервале $(-1, 2)$. Найти предельный (при $n \rightarrow \infty$) закон распределения случайной величины $\eta = \frac{\sum_{i=1}^n (2\xi_i - 1)}{2\sqrt{n}}$.

Составитель задания

к. ф.-м. н., доцент С. Д. Животов

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2021 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: **Теория вероятностей**
по направлению подготовки: **03.03.01 «Прикладные математика и физика»**
физтех-школа: **ФАКТ**
кафедра: **высшей математики**
курс: **2**
семестр: **4**

Трудоёмкость:
теор. курс: базовая часть — 2 зачет. ед.;
лекции — 30 часов
практические (семинарские)
занятия — 30 часов
лабораторные занятия — нет

Диф. зачёт — 4 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ — 60

Самостоятельная работа:
теор. курс — 30 часов

Программу и задание составил
к. ф.-м. н., доцент С. Д. Животов

Программа принята на заседании кафедры
высшей математики 19 ноября 2020 г.

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., профессор

Г. Е. Иванов

1. Случайные события. Алгебра событий, σ -алгебра. Достоверное, невозможное, противоположное, несовместное события.
2. Аксиоматика Колмогорова.
3. Классическое определение вероятности. Геометрическая вероятность. Статистическая интерпретация вероятности.
4. Теорема сложения вероятностей.
5. Условная вероятность. Независимые события. Теорема умножения.
6. Формула полной вероятности. Формула Байеса.
7. Последовательность независимых испытаний. Схема Бернулли, полиномиальная схема. Предельные теоремы для схемы Бернулли: локальная теорема Муавра–Лапласа, теорема Пуассона.
8. Цепи Маркова: основные понятия и свойства. Эргодическая теорема.
9. Случайные величины. Функция распределения, ее свойства.
10. Случайные векторы. Функция распределения, ее свойства.
11. Основные распределения: биномиальное, Пуассона, равномерное, нормальное (одномерное и многомерное).
12. Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание, его свойства. Ковариационная матрица, ее свойства. Моменты и их свойства. Энтропия. Уравнение линейной регрессии.
13. Функции случайного аргумента. Метод линеаризации.
14. Последовательности случайных величин, сходимость по вероятности и сходимость по распределению.
15. Неравенство Маркова. Неравенство Чебышёва. Неравенство Чернова. Закон больших чисел (Маркова, Чебышёва, Хинчина, Бернулли).
16. Характеристическая функция и ее свойства.
17. Центральная предельная теорема. Интегральная теорема Муавра–Лапласа.

Литература

1. *Чистяков В. П.* Курс теории вероятностей. — Санкт Петербург : Лань, 2003.
2. *Зубков А. М., Севастьянов Б. А., Чистяков В. П.* Сборник задач по теории вероятностей. — Москва : Наука, 1989.
3. *Гнеденко Б. В.* Курс теории вероятностей. — 6-е изд. — Москва : Наука, 1988.
4. *Крылов В. Ю.* Краткий курс теории вероятностей. — Москва : МФТИ, 1975.
5. *Боровков А. А.* Теория вероятностей. — 6-е изд. — Москва : Наука, 1986.
6. *Колмогоров А. Н.* Основные понятия теории вероятностей. — 2-е изд. — Москва : Наука, 1974.
7. *Феллер В. М.* Введение в теорию вероятностей и её приложения. Т.1. — Москва : Мир, 1984.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ


(срок сдачи 15–20 марта)

I. Комбинация событий. Вероятностное пространство. Классическое определение вероятности. Геометрическая вероятность

- Пусть A , B и C – произвольные события. Найти выражения для событий, состоящих в том, что из A , B и C :
 - произошли A и C , но B не произошло;
 - произошло хотя бы одно из этих событий;
 - произошло два и только два события;
 - ни одно событие не произошло;
 - произошло не более одного события.
- Колода игральных карт (36 листов, 4 масти по 9 карт в каждой) тщательно перетасована. Наудачу берут 6 карт (без возвращения). Описать вероятностное пространство, а также найти вероятность того, что среди этих карт:
 - окажется король пик;
 - окажутся представители всех мастей;
 - будет ровно 4 карты одной масти.
- Монета бросается до тех пор, пока два раза подряд она не выпадет одной и той же стороной. Каждому возможному исходу, требующему n бросаний, припишем вероятность 2^{-n} . Опишите вероятностное пространство и найдите вероятности следующих событий:
 - опыт окончится до седьмого бросания;
 - потребуется четное число бросаний.
- В n конвертов разложено по одному письму n адресатам. На каждом конверте наудачу написан один из n адресов. Найти вероятность p_n того, что хотя бы три письма отправятся по назначению. Вычислить предел p_n при $n \rightarrow \infty$.
- Определить вероятность того, что корни квадратного уравнения $x^2 + 2ax + b = 0$ вещественны, если равновозможны значения коэффициентов в квадрате $|a| \leq 1$, $|b| \leq 1$. Какова вероятность того, что при указанных условиях корни уравнения будут положительны?
- На плоскость, разлинованную параллельными линиями, расстояние между которыми L , бросают иглу длины $l \leq L$. Опишите вероятностное пространство. Какова вероятность того, что игла пересечет линию?

II. Условная вероятность. Независимые события. Последовательность независимых испытаний. Формула полной вероятности. Цепи Маркова

7. На шахматную доску наудачу ставят две ладьи. Событие A – ладьи попали на клетки разного цвета, событие B – ладьи побьют друг друга. Вычислить условные вероятности $P(A|B)$ и $P(B|A)$.
8. Два студента бросают монету и записывают результаты бросков. Первый выигрывает при появлении серии ГГР, второй при появлении серии РГГ. Найти вероятность выигрыша второго игрока, т.е. определить вероятность того, что серия РГГ появится раньше серии ГГР.
9. Рассматривается электрическая цепь, составленная из лампочек по следующей схеме:



Каждая из ламп независимо друг от друга перегорает с вероятностью p . Какова вероятность того, что вся цепь перегорит? Какова условная вероятность того, что лампочка 2 перегорела, если вся цепь перегорела? Какова условная вероятность того, что лампочка 3 перегорела, если известно, что вся цепь перегорела, а лампочка 2 не перегорела?

10. Урна содержит 5 белых и 6 черных шаров. Наудачу извлекается шар, после чего он возвращается в урну вместе с 3 шарами противоположного цвета. Обозначим $A_i, i = 1, 2$, событие, состоящее в том, что при i -м извлечении (без возвращения) шаров из этой урны будет отмечен белый шар. Найти вероятности:
 а) $P(A_i), i = 1, 2$; б) $P(A_1|A_2)$; в) $P(\bar{A}_1 A_2)$.
11. Горнолыжник спускается с горы по трассе, которая имеет n поворотов. С вероятностью p он падает на каждом повороте независимо от падений на других поворотах. Определить вероятность того, что:
 а) k -не падение будет на m -м повороте;
 б) за время спуска горнолыжник упадет не более 3 раз.
12. В круг вписан равносторонний треугольник, в который вписан круг. На эту область наудачу бросают 5 точек. Какова вероятность того, что ровно три точки попадут во внутренний круг, а в область вне треугольника попадет хотя бы одна точка.


13. Одинаковы ли шансы на успех у трех человек, если первому надо получить хотя бы одну шестерку при бросании игральной кости 6 раз, второму – не менее двух шестерок при 12 бросках, а третьему – не менее трех шестерок при 18 бросках?

14. В одном учебном заведении обучаются 100 студентов. День рождения наудачу выбранного студента приходится на определенный день года с вероятностью $1/365$ для каждого из 365 дней. Найти:

- вероятность того, что найдутся ровно два студента, имеющие день рождения 1 апреля;
- вероятность того, что найдутся хотя бы два студента, имеющие день рождения 1 апреля.

Провести все расчеты по биномиальному закону распределения, по локальной теореме Муавра–Лапласа и по теореме Пуассона. Сравнить результаты.

15. Найти предельное распределение системы, если её начальное состояние $(1,0,0,0)$, $(0,1,0,0)$ для случая а) и $(1,0,0)$, $(0,1,0)$ для случая б).



16. На основании многолетних наблюдений за мартовской погодой выявлены следующие закономерности:

- никогда не бывает двух ясных дней подряд;
- если сегодня ясно, то завтра с одинаковой вероятностью пойдет дождь или снег;
- если сегодня снег (или дождь), то с вероятностью $\frac{1}{2}$ погода не изменится, если все же она изменится, то в половине случаев снег заменяется дождем или наоборот, и лишь в половине случаев на следующий день будет ясная погода.

Найти вероятность ясной погоды через три дня после дождя. Найти вероятность того, что первый дождь будет 8 марта, если 1 марта ясно. Найти предельное распределение системы.

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 10–15 мая)

I. Случайные величины. Случайные векторы. Функции от случайных величин

- Пусть случайная величина ξ имеет функцию распределения $F(x)$. Найти функции распределения следующих случайных величин:
а) $2 - 4\xi$; б) $\xi^4 + 6$; в) $1/(\xi + 1)^2 (\xi \neq -1)$.
- Система случайных величин (ξ, η) имеет плотность распределения $\rho(x, y)$. Найти функции распределения и плотности распределения следующих случайных величин:
а) $\zeta = \xi + 3\eta$, б) $\zeta = \xi^2/\eta$.
- Найти плотность распределения частного ξ/η и суммы $\xi + \eta$, если случайные величины независимы и имеют:
а) равномерное распределение на отрезке $[1, 2]$;
б) стандартное нормальное распределение ($a = 0, \sigma = 1$).
- Случайный вектор (ξ, η) имеет нормальное распределение с вектором средних $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ и ковариационной матрицей $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Найти вероятность попадания вектора в область $x^2 + y^2 - x + y + xy < 1$.
- Лягушка совершает два прыжка, каждый — на метр. Направление прыжков выбирается наугад. В качестве случайной величины возьмем расстояние между начальным положением лягушки и конечным положением. Найти плотность распределения, математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины. Построить график функции распределения.
- Двумерное распределение случайных величин ξ и η задается с помощью таблицы

$\eta \setminus \xi$	-1	0	2
-1	1/5	0	1/5
1	0	1/5	1/5
2	1/10	1/10	0

Выяснить, зависимы или нет случайные величины ξ и η . Найти:

- а) $M\xi, M\eta, D\xi, D\eta, \text{cov}(\xi, \eta)$, коэффициент корреляции и ковариационную матрицу;

- б) закон распределения и функцию распределения произведения $\xi\eta$;
- в) уравнение линейной регрессии.

7. Плотность совместного распределения $p(x, y)$ величин ξ и η определяется равенствами $p(x, y) = c(x + y)$ при $0 \leq x \leq 1$ и $0 \leq y \leq 1$ и $p(x, y) = 0$ в остальных случаях. Найти:

- а) постоянную c ;
- б) плотности распределения ξ и η ;
- в) $M\xi, M\eta, D\xi, D\eta, \text{cov}(\xi, \eta)$, коэффициент корреляции и ковариационную матрицу;
- г) плотность распределения и построить функцию распределения $\min(\xi, \eta)$;
- д) уравнение линейной регрессии.

II. Характеристические функции. Закон больших чисел. Предельные теоремы

8. Найдите законы распределения, которым соответствуют следующие характеристические функции:

а) $e^{-it} \cos^3 3t$; б) $2(1 - \cos t)/t^2$.

9. Вычислите характеристические функции для следующих законов распределения:

а) распределения Коши: $p(x) = \frac{1}{\pi(1 + x^2)}$, $(-\infty < x < \infty)$;

б) нормального распределения с параметром $a = 0$.

Для всех вариантов определить характеристическую функцию и закон распределения случайной величины $\eta = \left(\sum_{k=1}^n \xi_k \right) / n$ в предположении о независимости ξ_k .

10. Студент получает на экзамене 5 с вероятностью 0.1; 4 – с вероятностью 0.4; 3 – с вероятностью 0.3 и 2 – с вероятностью 0.2. За время обучения он сдает 40 экзаменов. Найти симметричные пределы, в которых с вероятностью, близкой к 0.94, лежит средний балл студента:

- а) с помощью неравенства Чебышёва;
- б) с помощью центральной предельной теоремы.

11. Оценить вероятность, что при 4500 подбрасываниях игральной кости цифра 6 выпадет не менее чем 680 раз и не более чем 730 раз. Определить точность оценки.

- 12.** Последовательность независимых случайных величин $\{\xi_n\}$ задана законом распределения: ξ_n принимает значения $n, -n$ и 0 с вероятностями $\frac{1}{4^n}, \frac{1}{4^n}$ и $1 - \frac{2}{4^n}$ соответственно. Выполнен ли ЗБЧ для этой последовательности?
- 13.** Случайные величины ξ_k независимы и имеют показательное распределение с параметром $\lambda = 2$ ($p(x) = 2e^{-2x}, x > 0$). Найти пределы по вероятности при $n \rightarrow \infty$ последовательностей $\left\{ \frac{e^{\xi^1} + e^{\xi^2} + \dots + e^{\xi^n}}{n} \right\}$ и $\left\{ e^{\left(\frac{\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_n}{n} \right)} \right\}$.
- 14.** Случайные величины ξ_k независимы и одинаково распределены с плотностью $p(x) = (1 - \cos x)/\pi x^2, (-\infty < x < \infty)$. Найти предельное (при $n \rightarrow \infty$) распределение случайной величины $\eta = \left(\sum_{k=1}^n \xi_k \right) / n$.
- 15.** Случайные величины ξ_k независимы и равномерно распределены на интервале $(-1, 2)$. Найти предельный (при $n \rightarrow \infty$) закон распределения случайной величины $\eta = \frac{\sum_{i=1}^n (2\xi_i - 1)}{2\sqrt{n}}$.

Составитель задания

к. ф.-м. н., доцент С. Д. Животов

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2021 года

ПРОГРАММА

по дисциплине: Аналитическая механика

по направлению подготовки:

03.03.01 «Прикладные математика и физика»

физтех-школа: ФАКТ

кафедра: теоретической механики

курс: 2

семестр: 4

Трудоемкость:

теор. курс: базовая часть – 3 зачет. ед.

лекции – 30 часов

Экзамен – 4 семестр

практические (семинарские)

занятия – 30 часов

лабораторные занятия – нет

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 60 Самостоятельная работа
– 45 часов

Программу и задания составили:

к.т.н., доцент О. Е. Кириллов

к.ф.-м.н., доцент И. Ю. Полехин

Программа принята на заседании

кафедры теоретической механики

30 ноября 2020 года

Заведующий кафедрой

д.ф.-м.н.

С. В. Соколов

1. **Равновесие, устойчивость, движение вблизи устойчивого положения равновесия**

Определение положения равновесия. Условия равновесия системы с идеальными связями (принцип виртуальных перемещений). Условия равновесия голономных систем (в терминах обобщенных сил).

Определение устойчивости, асимптотической устойчивости и неустойчивости положения равновесия. Теоремы прямого метода Ляпунова для автономных систем: теоремы Ляпунова об устойчивости и асимптотической устойчивости, теорема Четаева о неустойчивости, теорема Барбашина–Красовского об условиях асимптотической устойчивости и неустойчивости.

Теорема Лагранжа–Дирихле об устойчивости равновесия консервативных механических систем. Условия неустойчивости консервативных систем по квадратичной части потенциальной энергии. Условие Маиевского–Четаева устойчивости «спящего волчка» Лагранжа. Элементы теории катастроф. Кривая равновесий. Основные типы бифуркаций в динамических системах. Влияние гироскопических и диссипативных сил на устойчивость равновесия. Теорема об асимптотической устойчивости строго диссипативных систем.

Первый метод Ляпунова исследования устойчивости. Теорема Ляпунова об устойчивости по линейному приближению. Критерий Рауса–Гурвица (без доказательства). Два сценария потери устойчивости: дивергенция и флаттер.

Малые колебания консервативных систем вблизи устойчивого положения равновесия. Уравнение частот. Главные (нормальные) координаты. Общее решение. Случай кратных корней.

Вынужденные колебания линейной стационарной системы под действием гармонических сил. Частотные характеристики. Явления резонанса и антирезонанса. Реакция линейной стационарной системы на негармоническое воздействие.

2. **Уравнения Гамильтона, вариационные принципы, интегральные инварианты**

Переменные Гамильтона. Функция Гамильтона. Канонические уравнения Гамильтона. Преобразование Лежандра уравнений Лагранжа в уравнения Гамильтона. Функция Гамильтона для консервативной системы.

Первые интегралы гамильтоновых систем. Скобки Пуассона. Теорема Якоби–Пуассона. Понижение порядка уравнений Гамильтона в случае циклических координат и для обобщенно-консервативных систем. Уравнения Уиттекера.

Преобразование лагранжиана при замене координат и времени. Теорема Эмми Нётер.

Действие по Гамильтону. Вариация действия по Гамильтону. Вариационный принцип Гамильтона.

Интегральные инварианты Пуанкаре–Картана и Пуанкаре. Обратные теоремы теории интегральных инвариантов. Теорема Лиувилля об инвариантности фазового объема гамильтоновой системы. Теорема Ли Хуа-чжуна об интегральных инвариантах первого порядка гамильтоновых систем.

3. Канонические преобразования.

Уравнение Гамильтона–Якоби

Канонические преобразования. Локальный критерий каноничности. Критерий каноничности в терминах производящих функций.

Преобразования, допускающие (q, \tilde{q}) -описание (свободные преобразования). Правила преобразования гамильтонианов при канонических преобразованиях. Фазовый поток гамильтоновых систем как однопараметрическое семейство канонических преобразований. Теорема Лиувилля о сохранении фазового объема. Сохранение фазового объема гамильтоновой системы.

4. Динамика твердого тела в идеальной несжимаемой жидкости

Уравнения Кирхгофа. Гамильтонова форма уравнений Кирхгофа. Присоединенные массы и присоединенные моменты инерции.

Литература

1. *Гантмахер Ф.Р.* Лекции по аналитической механике. — 3-е изд. — Москва : Физматлит, 2001.
2. *Журавлёв В.Ф.* Основы теоретической механики. — 2-е изд. — Москва : Физматлит, 2001; 3-е изд. — Москва : Физматлит, 2008.
3. *Маркеев А.П.* Теоретическая механика: учебник для университетов. — Изд. 3-е, испр. — Москва : Изд-во «Регулярная и хаотическая динамика», 2001.

4. *Амелькин Н.И.* Динамика твердого тела: учеб. пособие. — 2-е изд. — Москва : МФТИ, 2010.
5. *Амелькин Н.И.* Лагранжева и гамильтонова механика: учеб. пособие. — Москва : МФТИ, 2014.
6. *Яковенко Г.Н.* Краткий курс теоретической механики. — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006.
7. *Яковенко Г.Н.* Краткий курс аналитической динамики. — Москва : БИНОМ, 2004.
8. *Трухан Н.М.* Теоретическая механика. Методика решения задач: учеб. пособие. — Москва : МФТИ, 2010.

Первое задание

(срок сдачи с 22 по 27 марта 2021 г.)

Контрольная работа с 15 по 20 марта 2021 г.

1. **Равновесие. Принцип виртуальных перемещений**
14.10, 14.23, 14.36, 14.42
2. **Прямой метод Ляпунова в теории устойчивости движения**
17.25

Т1. Используя прямой метод Ляпунова, покажите, что нулевое положение равновесия системы асимптотически устойчиво

$$\dot{x} = -f_1(x) - f_2(y), \quad \dot{y} = f_3(x) - f_4(y),$$

где $f_i(z)$ — произвольные гладкие функции такие, что $\operatorname{sgn}(f_i(z)) = \operatorname{sgn}(z)$.

Указание. Функция Ляпунова $V(x, y) = \int_0^x f_3(z) dz + \int_0^y f_2(z) dz$.

Т2. Исследуйте на устойчивость систему

$$\dot{x} = 2y^3 - x^5, \quad \dot{y} = -x - y^3 + y^5.$$

Т3. Исследуйте на устойчивость систему

$$\dot{x} = xy - x^3 + y^3, \quad \dot{y} = x^2 - y^3.$$

Т4. Исследуйте на устойчивость систему ($\alpha, \beta > 0$)

$$\dot{x} = -(x - \beta y)(1 - ax^2 - by^2), \quad \dot{y} = -(y + \alpha x)(1 - ax^2 - by^2).$$

3. **Устойчивость равновесия консервативных систем**
15.15, 15.18, 15.21, 15.23
4. **Малые колебания консервативных систем**
16.1, 16.11, 16.33, 16.47, 16.64, 16.107
5. **Асимптотическая устойчивость диссипативных систем**
17.2, 17.8, 17.11 (а), 17.20, 17.28
6. **Вынужденные колебания**
18.3, 18.17, 18.31, 18.37, 18.62

Указание. При решении задачи 18.39 используйте нормальные координаты. Отдельно рассмотрите случай $\omega^4 - 3k^2\omega^2 + k^4 = 0$.

Второе задание

(срок сдачи с 10 по 15 мая 2021 г.)

Контрольная работа с 3 по 8 мая 2021 г.

7. **Функция Гамильтона и канонические уравнения**
19.1, 19.9, 19.15, 19.19, 19.35, 19.77
8. **Первые интегралы. Скобки Пуассона**
20.1, 20.15, 20.16, 20.30
9. **Принцип Гамильтона**
21.2, 21.4, 21.12, 21.14, 21.33
10. **Интегральные инварианты**
22.5, 22.15, 22.24, 22.32
11. **Канонические преобразования**
23.1, 23.2, 23.48, 23.116
12. **Уравнение Гамильтона–Якоби**
24.1, 24.22, 24.60, 24.63, 24.109
Т5. На плоскости рассматриваются два одинаковых неподвижных гравитационных центра, которые действуют на массивную точку M , которая может двигаться без трения по рассматриваемой плоскости. Составьте и решите уравнение Гамильтона–Якоби для этой системы.
Указание. Воспользуйтесь эллиптическими координатами:

$\xi = r_1 + r_2$, $\eta = r_1 - r_2$, r_i — расстояние от точки M до i -го притягивающего центра.

Номера задач взяты из сборника Пятницкий Е.С., Трухан Н.М., Ханукаев Ю.И., Яковенко Г.Н. Сборник задач по аналитической механике. — 2-е изд. — Москва : Наука, 1996; 3-е изд. — Москва : Физматлит, 2002.

Учебное издание

**СБОРНИК
программ и заданий**

**Физтех-школа аэрокосмических технологий
(ФАКТ)**

**для студентов 2 курса
на весенний семестр
2020–2021 учебного года**

Редакторы и корректоры: *И.А. Волкова, О.П. Котова*
Компьютерная верстка *В.А. Дружинина*

Подписано в печать 15.01.2021. Формат 60 × 84 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 3,5. Тираж 70 экз.
Заказ № 14.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный
исследовательский университет)»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495) 408-58-22, e-mail: rio@mipt.ru

Отдел оперативной полиграфии «Физтех-полиграф»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495) 408-84-30, e-mail: polygraph@mipt.ru

Для заметок

Для заметок