

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»



СБОРНИК

программ и заданий

**Физтех-школа прикладной математики и
информатики
(ФПМИ)**

**для студентов 2 курса
на весенний семестр
2020–2021 учебного года**

МОСКВА
МФТИ
2021

Сборник программ и заданий для студентов 2 курса на весенний семестр 2020–2021 учебного года. Физтех-школа прикладной математики и информатики (ФПМИ). – Москва : МФТИ, 2021. – 32 с.

Учебное издание

СБОРНИК программ и заданий

**Физтех-школа прикладной математики и информатики
(ФПМИ)**

**для студентов 2 курса
на весенний семестр
2020–2021 учебного года**

Редакторы и корректоры: *И.А. Волкова, О.П. Котова*
Компьютерная верстка *В.А. Дружинина*

Подписано в печать 15.01.2021. Формат 60 × 84 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 2,0. Тираж 200 экз.
Заказ № 19.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495) 408-58-22, e-mail: rio@mipt.ru

Отдел оперативной полиграфии «Физтех-полиграф»
141700, Московская обл., г. Долгопрудный, Институтский пер., 9
Тел. (495) 408-84-30, e-mail: polygraph@mipt.ru

© Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)», 2021

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2021 года

ПРОГРАММА

по дисциплине: Общая физика: оптика
по направлению подготовки: 03.03.01 «Прикладные математика и физика»
физтех-школа: для всех физтех-школ
кафедра: общей физики
курс: 2
семестр: 4

Трудоёмкость:

теор. курс: базовая часть – 4 зачет. ед.;

физ. практикум: базовая часть – 3 зачет. ед.;

лекции – 30 часов

практические (семинарские)

занятия – 30 часов

лабораторные занятия – 60 часов

Экзамен – 4 семестр

Диф. зачёт – 4 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 120

Самостоятельная работа:

теор. курс – 90 часов

физ. практикум – 75 часов

Программу и задание составили:

к.ф.-м.н., проф. В. А. Петухов
к.ф.-м.н., доц. К. М. Крымский
к.ф.-м.н., доц. Л. М. Колдунов
к.ф.-м.н., доц. П. В. Попов
к.т.н., доц. В. А. Овчинкин
к.ф.-м.н., доц. Ю. Н. Филатов

Программа принята на заседании кафедры
общей физики 4 декабря 2020 г.

Заведующий кафедрой
д.ф.-м.н., профессор

А. В. Максимычев

ОПТИКА

1. Геометрическая оптика. Принцип Ферма, законы преломления и отражения. Полное внутреннее отражение. Оптические инструменты: телескоп, микроскоп. Понятие о геометрических aberrациях. Элементы фотометрии: яркость источника, освещённость изображения.

Современные применения геометрической оптики в пределе коротких длин волн: рентгеновская микроскопия, проекционная рентгеновская литография, рентгеновская астрономия, микроанализ с пространственным разрешением.

2. Волновая оптика. Волновое уравнение, монохроматические волны, комплексная амплитуда, уравнение Гельмгольца, плоские и сферические волны, показатель преломления, фазовая скорость распространения. Поляризация света: линейная, круговая и эллиптическая. Естественный свет. Степень поляризации. Формулы Френеля, угол Брюстера.

Нерелятивистский эффект Доплера, поиск экзопланет.

3. Дисперсия показателя преломления, классическая теория дисперсии, нормальная и аномальная дисперсии. Комплексная диэлектрическая проницаемость и комплексный показатель преломления, связь мнимой части с поглощением света средой. Затухающие волны, закон Бугера. Показатель преломления плазмы. Радиоволны в ионосфере и дальняя радиосвязь. Групповая скорость. Распространение волнового пакета в неоднородной среде. Различные диапазоны длин волн, их особенности. Метаматериалы.

4. Принцип суперпозиции и интерференция монохроматических волн. Видность полос, ширина полосы. Просветление оптики. Статистическая природа излучения квазимонохроматической волны. Временная когерентность, функция временной когерентности, связь со спектральной интенсивностью (теорема Винера–Хинчина) и с видностью. Ограничение на допустимую разность хода в двухлучевых интерференционных схемах, соотношение неопределенностей.

5. Интерференция при использовании протяженных источников. Пространственная когерентность, радиус когерентности, функция пространственной когерентности, связь с распределением интенсивности излучения по источнику (теорема Ван Циттерта–Цернике). Ограничения на допустимые размеры источника и апертуру интерференции в двухлучевых схемах. Лазеры как источники излучения с высокой временной и пространственной когерентностью.

6. Дифракция волн. Принцип Гюйгенса–Френеля. Дифракция на тонком экране. Граничные условия Кирхгофа. Волновой параметр. Дифракция Френеля. Задачи с осевой симметрией, зоны Френеля, спираль Френеля.

Зонные пластинки, линза. Использование зонных пластинок для фокусировки рентгеновского излучения. Дифракция на дополнительном экране, пятно Пуассона. Дифракция на системе дополнительных экранов, теорема Бабинэ. Дифракция на краю, спираль Корню.

7. Дифракция Фраунгофера. Световое поле в зоне Фраунгофера как преобразование Фурье граничного поля. Дифракция Фраунгофера на щели, дифракционная расходимость. Дифракционный предел разрешения телескопа и микроскопа. Поле в фокальной плоскости линзы, поперечные и продольные размеры фокального пятна.

8. Спектральные приборы: призма, дифракционная решётка, интерферометр Фабри–Перо. Характеристики спектральных приборов: разрешающая способность, область дисперсии, угловая дисперсия.

Интерференция в тонких пленках и многослойных структурах, зеркала с высоким коэффициентом отражения. Искусственные многослойные структуры для отражения мягкого рентгеновского излучения. Радиотехнические аналоги дифракционных решеток.

9. Принципы фурье-оптики. Метод Рэлея решения задачи дифракции: волновое поле как суперпозиция плоских волн разных направлений (пространственное фурье-разложение), соотношение неопределённости. Дифракция Френеля на периодических структурах (эффект саморепродукции). Теория Аббе формирования оптического изображения, принцип двойной дифракции. Апертура, полоса пропускания пространственных частот оптической системы, связь с разрешающей способностью. Разрешающая способность при когерентном и некогерентном освещении.

10. Принципы голографии. Голограмма Габора. Голограмма с наклонным опорным пучком. Разрешающая способность голограммы. Условие Брэгга–Вульфа. Объёмная голограмма, объёмная решётка в регистрирующей среде.

Представление о голографической микроскопии биообъектов и голографической интерферометрии.

11. Кристаллооптика. Дихроизм, поляриды, закон Малюса. Двойное лучепреломление в одноосных кристаллах, разложение волны на обыкновенную и необыкновенную. Взаимная ориентация векторов k , E , D , B , направление вектора Пойнтинга, боковой снос световых пучков в кристаллах. Интерференционные явления в кристаллических пластинках. Понятие об искусственной анизотропии. Эффекты Фарадея, Керра и Поккельса и их применение.

12. Рассеяние света. Эффективное сечение рассеяния, диаграмма направленности, их зависимость от длины волны и от размера рассеивающих частиц, Рэлеевское рассеяние (рассеяние на флуктуациях плотности). Поляризация рассеянного света.

13. Нелинейные оптические явления. Нелинейная поляризация среды. Оценки интенсивности световой волны, при которых наблюдаются нелинейные эффекты. Наведенное двулучепреломление. Генерация второй гармоники, фазовый синхронизм. Оптическое выпрямление. Симметрия среды и генерация второй гармоники. Самофокусировка, критическая мощность самофокусировки, мелкомасштабная самофокусировка.

Понятие о комбинационном рассеянии света и вынужденном рассеянии Мандельштама–Бриллюэна.

14. Распространение электромагнитных волн в световодах. Градиентные световоды и световоды с резким изменением показателя преломления. Допустимая угловая апертура. Типы волн. Одномодовые и многомодовые световоды. Рэлеевское рассеяние как причина затухания световой волны в световодах. Применение для высокоскоростной связи. Область нулевой дисперсии. Ультракороткие импульсы.

Литература

Основная

1. *Сивухин Д.В.* Общий курс физики. Оптика. Т. IV. – Москва : Физматлит, 2018.
2. *Кингсен А.С., Локшин Г.Р., Ольхов О.А.* Основы физики. Т. I, ч. III, гл. 6–11. – Москва : Физматгиз, 2001.
3. *Кириченко Н.А.* Принципы оптики : учебное пособие. – Москва : МФТИ, 2016.
4. *Бутиков Е.И.* Оптика. – Москва : Высшая школа, 1986.
5. *Ахманов С.А., Никитин С.Ю.* Физическая оптика. – Москва : Издательство МГУ, Наука, 2004.

Дополнительная

1. *Горелик Г.С.* Колебания и волны. – Москва : Физматлит, 1959, 2007.
2. *Ландсберг Г.С.* Оптика. – Москва : Физматлит, 2003.
3. *Борн М., Вольф Э.* Основы оптики. – Москва : Наука, 1973.
4. *Козел С.М., Листвин В.И., Локшин Г.Р.* Введение в когерентную оптику и голографию. – Москва : МФТИ, 2000.
5. *Кольер Р.* Оптическая голография. – Москва : Мир, 1973.
6. *Крымский К.М.* Аберрации центрированных оптических систем – теория и расчёт. — Москва : МФТИ, 2015.
7. *Петухов В.А.* Оптические волокна : учебно-метод. пособие. – Москва : МФТИ, 2019.

ЗАДАНИЕ ПО ФИЗИКЕ
для студентов 2-го курса
на весенний семестр 2020/2021 учебного года

Дата	№ сем	Тема семинарских занятий	Задачи		
			0	I	II
01.02–06.02	1	Принцип Ферма. Геометрическая оптика и элементы фотометрии. Оптические инструменты.	1.4 01 02	1.29 1.22 1.9 1.56	1.15 T1 T2 1.57
08.02–13.02	2	Законы отражения, формулы Френеля. Поляризация. Поток энергии и давление света.	01 11.7 2.3	2.5+2.23 2.26 2.29 2.42	2.1 2.20 2.27 2.45
15.02–22.02	3	Дисперсия. Фазовая и групповая скорости.	10.2 10.5 ^(2,3,5) 01	10.8 10.43 10.75 10.77	10.21 10.24 10.35 T3
01.03–06.03	4	Интерференция монохроматических волн.	3.3 01 02	3.5 3.10 3.18 T4	3.16 3.11 3.20 3.35
08.03–13.03	5	Немонохроматический свет, временная когерентность. Пространственная когерентность	01 4.2 5.3 02	4.10 4.11 5.14 5.20	4.9 5.13 5.23 5.30
15.03–20.03	6	Дифракция Френеля. Зонные пластинки.	01 02 6.1	6.15 6.20 6.59 6.43	6.16 6.31 6.50 6.64
22.03–27.03	7	Дифракция Фраунгофера. Разрешающая способность оптических инструментов.	7.5 01 02	7.16 7.48 7.54 7.83	7.10 7.53 7.59 7.33
29.03–04.04	8	Спектральные приборы.	8.2 01 02	8.39 8.19 8.61 8.78	8.37 8.47 T5 T6

05.04– 10.04	9	Контрольная работа (по группам)			
12.04– 17.04	10	Сдача 1-го задания			
19.04– 24.04	11	Дифракция на синусоидальных решётках. Элементы фурье-оптики.	θ_1 θ_2 θ_3	9.1 9.15 9.22 9.26	9.11 9.17 9.28 9.79
26.04– 01.05	12	Голография.	θ_1 θ_2 θ_3	9.32 9.35 9.45 9.52	9.33 9.36 9.40 9.78
27.04– 02.05	13	Поляризация света. Элементы кристаллооптики.	11.17 11.1 11.12	11.9 11.16 11.54 11.28	11.13 11.60 11.80 <i>11.121</i>
03.05– 08.05	14	Рассеяние света. Элементы нелинейной оптики.	θ_1 θ_2 θ_3	<i>11.125</i> 11.89 <i>11.126</i> Т8	11.88 11.90 <i>11.128</i> Т7
10.05– 15.05	15	Сдача 2-го задания.			
17.05– 22.05	16	Зачёт.			

Примечание

Номера задач указаны по «Сборнику задач по общему курсу физики. Ч. 2. Электричество и магнетизм. Оптика / под ред. В. А. Овчинкина (**4-е** изд., испр. и доп.). – Москва : Физматкнига, 2017». *Курсивом отмечены задачи, которые необходимо брать из нового издания.*

Все задачи обязательны для сдачи задания. В каждой теме семинара задачи разбиты на 3 группы:


- 0** — задачи, которые студент должен решать в течение недели для подготовки к семинару;
- I** — задачи, рекомендованные для разбора на семинаре (преподаватель может разбирать на семинарах и другие равноценные задачи по своему выбору);

II — задачи для самостоятельного решения; их решения должны быть оформлены студентами в отдельных тетрадах и сданы преподавателю на проверку.

Задачи группы 0

Семинар 1

⁰1. На рис. показаны положение главной оптической оси тонкой линзы LL' и ход проходящего сквозь нее луча ABC . Найдите построением ход произвольного луча DE за линзой.



⁰2. Положительной линзой с фокусным расстоянием F создается изображение объекта на экране. Какому условию должно удовлетворять расстояние от объекта до экрана, чтобы это было возможно?

Семинар 2

⁰1. Выразить интенсивность плоской электромагнитной волны, распространяющейся в немагнитной среде с показателем преломления n , через амплитуду вектора напряженности электрического поля волны E_0 .

Семинар 3

⁰1. Концентрация электронов в нижних слоях ионосферы равна $N \sim 1,5 \cdot 10^6 \text{ см}^{-3}$. Какие электромагнитные волны будут испытывать отражение при вертикальном радиозондировании ионосферы?

Ответ: $\nu < 10 \text{ МГц}$ ($\lambda > 30 \text{ м}$).

Семинар 4

⁰1. На экран падают две плоские волны с равными амплитудами A под малыми углами $\varphi_{1,2} = \pm 0,01$ рад. Длина волны $\lambda = 500 \text{ нм}$, нормаль к экрану и волновые векторы волн лежат в одной плоскости, см на экране. Определите ширину интерференционных полос (см. рис.).



Ответ: 25 мкм .

⁰2. На тонкую пленку с показателем преломления n падает пучок белого света под углом θ к нормали. При какой минимальной толщине $b_{\text{мин}}$ и в какой цвет будет окрашена пленка в отраженном свете?

Семинар 5

⁰1. В двухлучевом интерференционном опыте используется источник

света с длиной волны $\lambda = 500$ нм и шириной спектра $\Delta\lambda = 10$ нм. Оцените максимально допустимую разность хода лучей Δ_{\max} и максимальное число интерференционных полос m_{\max} , которые можно наблюдать в этом опыте.

Ответ: $\Delta_{\max} \sim 25$ мкм, $m_{\max} \sim 100$.

02. Найдите апертуру интерференции в опыте с бипризмой с преломляющим углом α и показателем преломления n , если источник и плоскость наблюдения расположены на одинаковых расстояниях от бипризмы.

Семинар 6

01. Щель ширины $b = 1$ мм освещается параллельным пучком света с длиной волны $\lambda = 500$ нм. Оцените, на каком расстоянии L от щели необходимо разместить экран, чтобы наблюдать на нём дифракцию Френеля.

Ответ: $L \sim 1$ м.

02. На ирисовую диафрагму с переменным радиусом отверстия, расположенную на расстоянии L от экрана, падает свет с длиной волны λ . Диафрагму постепенно открывают, начиная с $R \approx 0$. При каком радиусе R интенсивность света в центре экрана впервые обратится в ноль?

Семинар 7

01. Через маленькое круглое отверстие проходит монохроматический параллельный пучок света и создает на удаленном экране дифракционную картину Фраунгофера. Во сколько раз изменится освещённость в центре экрана, если увеличить диаметр отверстия вдвое?

Ответ: увеличится в 16 раз.

02. Плоская световая волна дифрагирует на щели с шириной $b = 10\lambda$, где λ — длина волны. Оценить отношение интенсивностей нулевого и первого дифракционных максимумов.

Ответ: $I_1/I_0 \approx 0,05$.

Семинар 8

01. На дифракционную решетку, имеющую период $d = 10$ мкм, нормально падает свет от желтого дублета натрия ($\lambda_1 = 5890$ Å, $\lambda_2 = 5896$ Å). Оцените угловое расстояние между максимумами $\delta\varphi$ во втором порядке ($m = 2$).


Ответ: $\delta\varphi \approx 1,2 \cdot 10^{-4}$ рад.

02. Дифракционная решётка с периодом d имеет размер $D = 10^3 d$ в направлении, перпендикулярном штрихам. Ширина прозрачных штрихов решётки равна половине периода. Определите максимальную разрешающую способность решётки в спектрах 1-го и 2-го порядков.

Ответ: $R_1 = 10^3$, $R_2 = 0$.

Семинар 11

01. Плоская волна с длиной волны λ распространяется в плоскости xz под углом α к оси z . Запишите распределение комплексной амплитуды волны и интенсивности в плоскости $z = 0$. Найдите разность фаз между колебаниями в точках $z = 0$ и $z = L$, лежащих на оси z (см. рис.).



02. Решётка освещается нормально падающей плоской монохроматической волной с амплитудой A . Укажите пространственные частоты и амплитуды плоских волн за дифракционной решёткой, прозрачность которой $\tau(x) = \cos^2(\Omega x)$.

03. Оцените ширину пространственного спектра плоских волн Δk_x при дифракции плоской монохроматической волны на щели шириной b .

Семинар 12

01. Точечный источник с длиной волны λ расположен в начале координат. Пользуясь параболическим приближением, найти распределение комплексной амплитуды и интенсивности в плоскости $x = L$.

02. Голограмму точечного источника, находящегося на расстоянии L от фотопластинки, записали по схеме Габора на длине волны λ . Где будут находиться мнимое и действительное изображения, если восстановление голограммы производить светом с длиной волны 2λ ?

03. Почему при получении голографических изображений объёмных объектов практический интерес представляют только мнимые изображения? Поясните ответ с помощью схематического рисунка.

Семинар 14

01. Пользуясь формулой Рэлея, оцените коэффициент пропускания света слоем воздуха толщиной 8 км в атмосфере вблизи поверхности Земли, для двух длин волн: $\lambda = 400$ нм (фиолетовый свет) и 650 нм (красный свет). Показатель преломления воздуха принять равным $n - 1 = 2,9 \cdot 10^{-4}$.

Ответ: $T_{400} \approx 0,7$, $T_{700} \approx 0,95$.

02. Лазерный пучок проходит сквозь слабопоглощающую жидкость (интенсивность пучка максимальна на его оси). Каков знак возникающей в жидкости линзы?

03. Молекулы некоторой жидкости имеют разную поляризуемость по разным осям. Как будут ориентироваться молекулы в поле световой волны: максимальной поляризуемостью по направлению \vec{E} или перпендикулярно \vec{E} ? Ответ обосновать.

Текстовые задачи


T1. а) У некоторого близорукого человека дальняя граница области, в которой он видит предметы резко, находится на расстоянии L_d от глаза. Очки какой оптической силы D ему следует носить, чтобы эта граница переместилась в бесконечность? Провести расчет для $L_d = 0,5$ м.

б) У некоторого дальнорядного человека ближняя граница области, в которой он видит предметы резко, находится на расстоянии L_b от глаза. Очки какой оптической силы ему следует надеть, чтобы эта граница переместилась в «положение наилучшего зрения» $L_0 = 25$ см. Провести расчет для $L_b = 1$ м.

Ответ: а) $D = -2$ дптр, б) $D = +3$ дптр.


T2. Найти тип идеальной формы поверхности плоско-выпуклой линзы для фокусировки параллельного пучка в точку (сфера, гипербола, парабола или др). Линза расположена плоской поверхностью к плоскому волновому фронту.

T3. (2019) Параллельный пучок излучения длиной 100 фс и средней длиной волны $\lambda = 500$ нм фокусируется положительной линзой толщиной $L = 6$ мм в центре и близкой к нулю на краях. Пучок заполняет всю линзу. Показатель преломления материала линзы $n = 1,7$, групповая скорость в стекле $v_{гр} = 0,55c$. Оценить длительность импульса в фокусе линзы.



Ответ: $\tau \approx 2,4$ пс.

T4. (2019) Падающая на бипризму Френеля БФ плоская монохроматическая линейно поляризованная волна создает на плоском экране Э интерференционную картину с шириной полосы Λ . Плоскость падения перпендикулярна плоскости экрана. Поле E волны колеблется параллельно плоскости падения. Длина волны λ . Определите видность V интерференционной картины.




Ответ: $V = 1 - \frac{1}{2} \left(\frac{\lambda}{\Lambda} \right)^2$.

T5. Спектральная линия H_α атомарного водорода ($\lambda = 6563$ Å) имеет тонкую структуру в виде двух «сублиний» в интервале длин волн $\delta\lambda \approx 0,16$ Å. Какой должна быть минимальная база интерферометра Фабри–Перо L с коэффициентом отражения зеркал по интенсивности $\rho = 0,9$, чтобы с его

помощью можно было обнаружить тонкую структуру линии? Определите также для такого интерферометра: дисперсионную область $\Delta\lambda$, направление на ближайший к центру максимум θ_1 и угловую дисперсию $d\theta/d\lambda$ вблизи него. В центре картины – светлое пятно.

Ответ: $L = 0,4$ мм, $\Delta\lambda = 5 \text{ \AA}$, $\theta_1 = 2,3^\circ$, $D = 4 \cdot 10^{-3} \text{ \AA}^{-1}$.

Т6. Современные фотодиоды обеспечивают огромный диапазон линейности, до 11 порядков по интенсивности света, то есть в этом диапазоне фототок линейно зависит от интенсивности света, падающего на фотодиод. Это позволяет измерять очень малые интенсивности модулированных по амплитуде световых сигналов на фоне гораздо более мощной постоянной засветки.



Излучение хорошо стабилизированного непрерывного лазера с длиной волны 0,6 мкм пропускается через интерферометр Майкельсона, в котором одно из зеркал Z_1 может колебаться с малой амплитудой a . Зеркало Z_2 чуть-чуть наклонено, так что в плоскости фотоприемника получают достаточно широкие (больше размера фотоприемника) интерференционные полосы. Смещение зеркала Z_1 приводит к смещению интерференционных полос. Оцените минимальное значение a_{\min} амплитуды колебаний, которое можно измерить данной схемой, если измерительное устройство позволяет обнаружить периодические колебания фототока, составляющие величину 10^{-10} от величины тока в максимуме интерференционной картины. В каком месте интерференционной картины (в максимуме, минимуме интенсивности или в другом месте) следует располагать фотодиод для получения максимальной чувствительности?

Ответ: $a_{\min} \approx 10^{-16}$ см.

Т7. Кристалл ниобата лития обладает сильной нелинейностью и довольно часто используется для генерации второй гармоники. Показатели преломления для обыкновенной и необыкновенной волны этого кристалла сильно зависят от температуры. Для необыкновенной волны $\frac{dn_e}{dT} = 5,4 \cdot 10^{-6} (\text{°C})^{-1}$, а для обыкновенной $\frac{dn_o}{dT} = 37,9 \cdot 10^{-6} (\text{°C})^{-1}$. Оцените, насколько надо изменить температуру кристалла, чтобы интенсивность генерации второй гармоники стала равной нулю. Считайте, что до изменения

температуры было достигнуто условие фазового синхронизма, длина волны накачки равна $\lambda = 1$ мкм, а длина кристалла $l = 1$ см.

Ответ: $\delta T \approx 1.54^\circ\text{C}$.

Т8. Найти пропускание атмосферой солнечного излучения во время восхода. Сделать расчет для красного ($\lambda = 700$ нм) и фиолетового ($\lambda = 400$ нм) цветов. Атмосферу считать изотермической, потери, не связанные с рэлеевским рассеянием (пыль, облака, ...), не учитывать. Показатель преломления атмосферы вблизи поверхности Земли равен $n_0 = 1,0003$.

Ответ: для $\lambda = 400$ нм $I_{\text{кон}}/I_0 = 5,3 \cdot 10^{-6}$, для $\lambda = 700$ нм $I_{\text{кон}}/I_0 = 0,27$.

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2021 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: Гармонический анализ
по направлению подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»,
03.03.01 «Прикладные математика и физика»,
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
физтех-школа: ФПМИ
кафедра: высшей математики
курс: 2
семестр: 4

Трудоёмкость:

теор. курс: базовая часть — 3 зач. ед.;

лекции — 30 часов

практические (семинарские)

занятия — 30 часов

лабораторные занятия — нет

Экзамен — 4 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ — 60

Самостоятельная работа:

теор. курс — 45 часов

Программу и задание составил

д. ф.-м. н., профессор А. Л. Лукашов

Программа принята на заседании кафедры

высшей математики 19 ноября 2020 г.

Заведующий кафедрой

д. ф.-м. н., профессор

Г. Е. Иванов

1. Лемма Римана. Тригонометрические ряды Фурье суммируемых функций. Стремление к нулю коэффициентов Фурье. Представление частичной суммы ряда Фурье интегралом через ядро Дирихле. Принцип локализации. Достаточные условия сходимости рядов Фурье в точке. Равномерная сходимость рядов Фурье. Почленное дифференцирование и интегрирование рядов Фурье. Порядок убывания коэффициентов Фурье. Ряд Фурье в комплексной форме.
2. Суммирование рядов Фурье методом средних арифметических. Теоремы Вейерштрасса о приближении непрерывных функций тригонометрическими и алгебраическими многочленами.
3. Метрические и линейные нормированные пространства. Сходимость в метрических пространствах. Полные метрические пространства, полные линейные нормированные (банаховы) пространства. Полнота пространства $C[a, b]$. Неполнота пространств непрерывных на отрезке функций с интегральными нормами. Сравнение норм: сравнение равномерной сходимости, сходимостей в среднем и в среднем квадратичном. Полные системы в линейных нормированных пространствах.
4. Бесконечномерные евклидовы пространства. Ряд Фурье по ортонормированной системе. Минимальное свойство коэффициентов Фурье, неравенство Бесселя. Равенство Парсеваля. Ортонормированный базис в бесконечномерном евклидовом пространстве. Гильбертовы пространства. Необходимое и достаточное условие того, чтобы последовательность чисел являлась последовательностью коэффициентов Фурье элемента гильбертова пространства с фиксированным ортонормированным базисом. Связь понятий полноты и замкнутости ортонормированной системы.
5. Тригонометрические ряды Фурье для функций, суммируемых с квадратом. Полнота тригонометрической системы, равенство Парсеваля.
6. Интегралы Римана и Лебега, зависящие от параметра, их свойства. Несобственные интегралы Римана, зависящие от параметра; равномерная сходимость. Критерий Коши равномерной сходимости несобственных интегралов. Признаки Вейерштрасса и Дирихле. Непрерывность, дифференцирование и интегрирование по параметру несобственных интегралов. Применение теории интегралов, зависящих от параметра, к вычислению определенных интегралов. Интегралы Дирихле и Лапласа. Интегралы Эйлера — гамма- и бета- функции. Выражение бета-функции через гамма-функцию.
7. Интеграл Фурье. Представление функции интегралом Фурье. Преобразование Фурье суммируемой функции и его свойства: непрерывность,

стремление к нулю на бесконечности. Формулы обращения. Преобразование Фурье производной и производная преобразования Фурье.

8. Пространство основных функций D и пространство обобщенных функций D' . Регулярные и сингулярные обобщенные функции. Дельта-функция. Умножение обобщенной функции на бесконечно дифференцируемую. Сходимость в пространстве обобщенных функций. Дифференцирование обобщенных функций.

Литература

Основная

1. *Бесов О. В.* Лекции по математическому анализу. — Москва : Физматлит, 2014, 2015, 2016.
2. *Иванов Г. Е.* Лекции по математическому анализу Ч. 2 — Москва : МФТИ, 2011.
3. *Кудрявцев Л. Д.* Курс математического анализа. — 5-е изд. — Москва : Дрофа, 2003.
4. *Петрович А. Ю.* Лекции по математическому анализу. Ч. 3. Кратные интегралы. Гармонический анализ. — Москва : МФТИ, 2018.
5. *Тер-Крикоров А. М., Шабунин М. И.* Курс математического анализа. — Москва : Физматлит, 2003.
6. *Яковлев Г. Н.* Лекции по математическому анализу. Ч. 2, 3. — Москва : Физматлит, 2004.

Дополнительная

7. *Никольский С. М.* Курс математического анализа. Т. 1, 2. — 5-е изд. — Москва : Физматлит, 2000.
8. *Фихтенгольц Г. М.* Курс дифференциального и интегрального исчисления. — 8-е изд. — Москва : Физматлит, 2007.

ЗАДАНИЯ

Литература

1. Сборник задач по математическому анализу. Интегралы. Ряды: учебное пособие/под ред. Л.Д. Кудрявцева. — Москва : Физматлит, 2003. (цитируется — С2)
2. Сборник задач по математическому анализу. Функции нескольких переменных: учебное пособие/под ред. Л.Д. Кудрявцева. — Москва : Физматлит, 2003. (цитируется — С3)

Замечания

1. Задачи с подчёркнутыми номерами рекомендовано разобрать на семинарских занятиях.
2. Задачи, отмеченные *, являются необязательными для всех студентов.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 15–20 марта)

I. Тригонометрические ряды Фурье

С.2. §22: 1(5); 11; 14; 30; 42; 45 В каждом примере постройте график суммы ряда Фурье и исследуйте ряд на равномерную сходимость на \mathbb{R} .

С.2. §22: 23*; 65; 67; 68; 72; 110; 111(4;3).

1. Сходятся ли равномерно ряды Фурье функции $f(x) = e^x$, $x \in [0; \pi/2]$ по системам:

а) $\{\sin(2k - 1)x\}_{k=1}^{\infty}$; б) $\{\sin 2kx\}_{k=1}^{\infty}$;

в) $\{\cos(2k - 1)x\}_{k=1}^{\infty}$; г) $\{\cos 2kx\}_{k=0}^{\infty}$?

Постройте графики сумм этих рядов.

2. Не вычисляя коэффициентов Фурье, определить порядок их убывания

а) x^{10} ; б) x^5 ; в) $(x^2 - \pi^2)^{10}$; г) $(\pi^2 - x^2) \sin^2 x$.


С.2. §22: 115; 121. С помощью равенства Парсеваля вычислите суммы

рядов: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$; $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6}$.

С.2. §16: 47*(2); 48(1; 3).

II. Функциональные пространства

3. Докажите, что если f – функция, непрерывная на отрезке $[a, b]$, а $\{f_n\}$ – последовательность функций, непрерывных на $[a, b]$, то между разными видами сходимости имеются связи, указанные в схеме (при перечеркнутой стрелке привести контрпример):



С.3. §18: 97; 98*.

4. Докажите, что система функций $\{x^n\}_{n=0}^{\infty}$ полна в пространствах $C[a, b]$, $L_1[a, b]$, $L_2[a, b]$.

С.3. §19: 116; 126*.

5. Полна ли система функций $\{x, x^3, \dots, x^{2k+1}, \dots\}$ в пространстве а) $C([1; 2])$; б) в пространстве $C([0; 1])$?
6. Полна ли система $\{\cos(2k - 1)x\}_{k=0}^{\infty}$ в пространстве:
а) $C[0; \pi/2]$; б) $L[0; 2]$?

30 + 4*

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 12–17 мая)

I. Собственные интегралы, зависящие от параметра

С.3. §13: 2(5); 14(2); 17; 18*(2).

§15: 1(3).

II. Несобственные интегралы, зависящие от параметра

С.3. §14: 1(1) — исследовать также при $\alpha \in (1; +\infty)$.

1(2) — исследовать также при $\alpha \in (0; 1)$

С.3. §14: 6(3, 4); 7(3, 5, 6); 8(2).

1. Вычислите интегралы Дирихле и Лапласа:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin ax}{x} dx, \quad \int_0^{+\infty} \frac{\cos ax}{1+x^2} dx, \quad \int_0^{+\infty} \frac{x \sin ax}{1+x^2} dx.$$

С.3. §15: 1(4); 2(4); 3(2); 5(2); 6(1, 4, 5); 13(4); 15(4).

С.3. §16: 7(4); 9(3); 12(9); 10*(3).

III. Интеграл Фурье. Преобразование Фурье

С.2. §12: 248; 254.

С.3. §17: 1(3); 2(4); 5(2); 6(1); 7(4); 8(1,5); 14(1,3); 17*(1).

IV. Обобщенные функции

С.3. §21: 58*; 60.

2. Докажите, что в D' справедливы равенства:

$$а) \lim_{a \rightarrow +0} \frac{a}{a^2 + x^2} = \pi \delta(x); \quad б) \lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{x} \sin \frac{x}{a} = \pi \delta(x).$$

С.3. §21: 71; 75*; 77*; 84.

3. Найдите в D'

$$\lim_{\xi \rightarrow +0} \frac{x\xi}{(x^2 + \xi^2)^2}.$$

4. Упростите в D' выражения:

а) $(e^{\sin x} + x \cos x)\delta(x)$; б) $\left(\frac{\sin x}{1+x^2} - \operatorname{ch} x\right)\delta'(x)$; в) $e^{x^2}\delta''(x)$.

45 + 6*

Составитель задания

д. ф.-м. н., профессор С. А. Гриценко

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2021 г.

ПРОГРАММА

по дисциплине: Дифференциальные уравнения
по направлению подготовки: 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»,
03.03.01 «Прикладная математика и физика»,
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
16.03.01 «Техническая физика»,
27.03.03 «Системный анализ и управление»
физтех-школы: для всех физтех-школ
кафедра: высшей математики
курс: 2
семестр: 4

Трудоёмкость:
теор. курс: базовая часть — 4 зачет. ед.;
лекций — 30 часов
практические (семинарские)
занятия — 30 часов
лабораторные занятия — нет

Экзамен — 4 семестр

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ — 60

Самостоятельная работа:
теор. курс — 90 часов

Программу и задание составили:

д. ф.-м. н., профессор А. М. Бишаев
д. т. н., профессор А. Е. Умнов
д. ф.-м. н., профессор С. Е. Жуковский
к. ф.-м. н., доцент В. Ю. Дубинская
к. ф.-м. н., доцент А. Ю. Семенов
к. ф.-м. н., доцент О. А. Пыркова

Программа принята на заседании кафедры
высшей математики 19 ноября 2020 г.

Заведующий кафедрой
д. ф.-м. н., профессор

Г. Е. Иванов

- 1. Основные понятия, простейшие типы дифференциальных уравнений.** Основные понятия. Простейшие типы уравнений первого порядка: уравнения с разделяющимися переменными, однородные, линейные, уравнения в полных дифференциалах. Интегрирующий множитель. Уравнение Бернулли или Риккати. Метод введения параметра для уравнения первого порядка, не разрешенного относительно производной. Методы понижения порядка дифференциальных уравнений. Использование однопараметрических групп преобразований для понижения порядка дифференциальных уравнений (по усмотрению лектора).
- 2. Линейные дифференциальные уравнения и линейные системы дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.** Формула общего решения линейного однородного уравнения n -го порядка. Отыскание решения линейного неоднородного уравнения в случае, когда правая часть уравнения является квазимногочленом. Уравнение Эйлера.
Формула общего решения линейной однородной системы уравнений в случае простых собственных значений матрицы коэффициентов системы. Теорема о приведении матрицы линейного преобразования к жордановой форме (без доказательства). Формула общего решения линейной однородной системы в случае кратных собственных значений матрицы коэффициентов системы. Отыскание решения линейной неоднородной системы уравнений в случае, когда свободные члены уравнения являются квазимногочленами (без доказательства).
Матричная экспонента и ее использование для получения формулы общего решения и решения задачи Коши для линейных однородных и неоднородных систем уравнений. Преобразование Лапласа и его применение для решения линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами (по усмотрению лектора). Исследование краевых задач для линейных уравнений второго порядка при наличии малого параметра при старшей производной (по усмотрению лектора).
- 3. Элементы вариационного исчисления.** Основные понятия. Простейшая задача вариационного исчисления. Задача со свободными концами, задача для функционалов, зависящих от нескольких неизвестных функций, и задача для функционалов, содержащих производные высших порядков. Условный экстремум: изопериметрическая задача, задача Лагранжа (без доказательства).
- 4. Задача Коши.** Теорема существования и единственности решения задачи Коши для нормальной системы дифференциальных уравнений и для уравнения n -го порядка в нормальном виде. Теоремы о продолжении решения. Характер зависимости решения задачи Коши от параметров

и начальных данных: непрерывность, дифференцируемость (без доказательства). Задача Коши для уравнений первого порядка, не разрешенных относительно производной. Особое решение.

5. **Автономные системы дифференциальных уравнений.** Основные понятия и свойства фазовых траекторий. Классификация положений равновесия линейных автономных систем уравнений второго порядка. Характер поведения фазовых траекторий в окрестности положения равновесия двумерных автономных нелинейных систем уравнений. Устойчивость и асимптотическая устойчивость положения равновесия автономной системы. Достаточные условия асимптотической устойчивости.

6. **Первые интегралы и линейные однородные уравнения в частных производных первого порядка.** Первые интегралы систем обыкновенных дифференциальных уравнений. Критерий первого интеграла. Теорема о числе независимых первых интегралов.

Формула общего решения линейного однородного уравнения в частных производных первого порядка. Постановка задачи Коши для таких уравнений. Теорема существования и единственности решения задачи Коши.

7. **Линейные дифференциальные уравнения и линейные системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами.** Теорема существования и единственности решения задачи Коши для нормальных линейных систем уравнений и для линейного уравнения n -го порядка в нормальном виде.

Фундаментальная система и фундаментальная матрица решений линейной однородной системы уравнений. Структура общего решения линейной однородной и неоднородной системы уравнений. Определитель Вронского. Формула Лиувилля–Остроградского. Метод вариации постоянных или формула Коши для линейной неоднородной системы уравнений. Следствия для линейных уравнений n -го порядка. Теорема Штурма и следствия из нее.

Уравнение Бесселя и некоторые свойства его решений (по усмотрению лектора). Асимптотическое поведение решений при больших значениях аргумента (по усмотрению лектора).

Литература

Основная

1. *Понтрягин Л. С.* Обыкновенные дифференциальные уравнения. — Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, 2001.
2. *Филиппов А. Ф.* Введение в теорию дифференциальных уравнений. — Москва : УрСС, 2004, 2007; — Москва : КомКнига, 2007, 2010, <http://bookfi.org/book/791964>.
3. *Степанов В. В.* Курс дифференциальных уравнений. — Москва : ЛКИ, 2008.

4. Романко В. К. Курс дифференциальных уравнений и вариационного исчисления. — Москва : Лаборатория базовых знаний, 2000–2011.
5. Федорюк М. В. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — Санкт-Петербург : Лань, 2003.
6. Умнов А. Е., Умнов Е. А. Основы теории обыкновенных дифференциальных уравнений. — Москва : МФТИ, 2016, <http://www.umnov.ru>.

Дополнительная

7. Гельфанд И. М., Фомин С. В. Вариационное исчисление. — Москва : Физматгиз, 1961, <http://techlibrary.ru/bookpage.htm>.
8. Петровский И. Г. Лекции по теории обыкновенных дифференциальных уравнений. — УрСС, 2003; — Москва : Физматлит, 2009.
9. Тихонов А. Н., Васильева А. Б., Свешников А. Г. Дифференциальные уравнения. — Москва : Физматгиз, 1985.
10. Куццов Л. П., Николаев В. С. Курс лекций по теории обыкновенных дифференциальных уравнений: учебное пособие. — Москва : МФТИ, 2003.
11. Ипатов В. М., Пыркова О. А., Седов В. Н. Дифференциальные уравнения. Методы решений. — Москва : МФТИ, 2007, 2012.

ЗАДАНИЯ

Литература

1. Сборник задач по дифференциальным уравнениям и вариационному исчислению /под ред. Романко В. К.. — Москва : Физматлит, 2003. (цитируется — С)
2. Филиппов А. Ф. Сборник задач по дифференциальным уравнениям. — Москва : Ижевск : 2005; — Москва : МГУ, 2011; — Москва : ЛКИ, 2008. (цитируется — Ф)

Замечания

1. Задачи с подчёркнутыми номерами рекомендовано разобрать на семинарских занятиях.
2. Задачи, отмеченные *, являются необязательными для всех студентов.

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 15–20 марта)

I. Задача Коши

С. §5: 26; 28а.

С. §6: 36; 49.

Ф.: 1065; 1066; 1067*.

1. Доказать, что при $\alpha > 0$ любое решение уравнения $y' = |y|^\alpha$ не может быть продолжено на бесконечный интервал $(-\infty; +\infty)$.

2. Рассмотреть уравнение $y'' - (y + 1)y' + y = 0$. Показать, что прямая $y = 1$ является дискриминантным множеством для этого уравнения, но не является решением. Показать, что через каждую точку прямой $y = 1$ проходят две интегральные кривые уравнения, имеющие общую касательную. Решить краевую задачу:
 $y'' - (y + 1)y' + y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(2) = e$. Изобразить график полученного решения.

II. Линейные уравнения с переменными коэффициентами

Ф.: 649; 664; 667; 668*; 673; 678.

Ф. §22: 47*; 59.

С. §9: 10; 31; 53; 64; 68(a).

3. Доказать, что уравнение Бесселя $x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0$, где $\nu = \text{const}$ на $(0; \infty)$, не может иметь двух линейно независимых решений, ограниченных в окрестности нуля вместе со своими первыми производными.

III. Теорема Штурма

Ф.: 723; 725*; 726.

С. §10: 2; 3; 6.

4. Доказать, что любое нетривиальное решение уравнения $y'' - 2xy' + y = 0$ на интервале $(-\infty; +\infty)$ имеет не более трех нулей.
5. Доказать, что:

а) любое нетривиальное решение уравнения Бесселя

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - \nu^2)y = 0, \quad \nu = \text{const}$$

имеет бесконечное число нулей на промежутке $(0, +\infty)$;

- б)* расстояние между последовательными нулями $|x_{n+1} - x_n|$ любого указанного выше решения стремится к π при $n \rightarrow +\infty$.

IV. Исследование поведения фазовых траекторий

Во всех задачах для фокусов и узлов определить, являются ли они устойчивыми или неустойчивыми.

Ф.: 964; 972*; 973; 974; 975; 978*.

С. §13: 9; 15; 39; 44; 45.

35+7*

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ

(срок сдачи 3–8 мая)

I. Первые интегралы и их использование для решений автономных систем

С. §14: 12.

Ф.: 1149.

1. Найти первые интегралы уравнений. Используя их, исследовать поведение траекторий на фазовой плоскости.

а) $\ddot{x} + \sin x = 0$; б) $\ddot{x} - x + x^2 = 0$.

С. §16: 5; 26.

II. Линейные однородные уравнения в частных производных первого порядка

С. §17: 5; 16; 22; 79; 83.

2. В области $x > 0$, $y > 0$, $z > 0$ найти все решения уравнения

$$(x^2 + y^2) \frac{\partial u}{\partial x} + 2xy \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{x^3 - xy^2}{z} \frac{\partial u}{\partial z} = 0$$

и решить задачу Коши $u = z^2$ при $y^2 - x^2 = 1$.

III. Вариационное исчисление

С. §19: 21; 45; 72; 105.

3. Исследовать на экстремум функционал, определив знаки приращения

$$\int_1^2 \left(\frac{2yy'}{x} - 7 \frac{y^2}{x^2} - (y')^2 - 12 \frac{y}{x} \right) dx, \quad y(1) = 3, \quad y(2) = 1.$$

С. §20.1: 9; 12.

4. Исследовать на экстремум функционал, определив знаки приращения

$$\int_1^2 (2y + yy' + x(y')) dx, \quad y(1) = 1.$$

С. §20.2: 5.

С. §20.3: 2.

С. §21: 1.

5*. Среди всех кривых на цилиндре $x^2 + y^2 = 1$, соединяющих точки $(1, 0, 0)$ и $(0, 1, 1)$ найти кривую наименьшей длины (геодезическую кривую).

23+1*

УТВЕРЖДЕНО
Проректор по учебной работе
А. А. Воронов
15 января 2021 года

ПРОГРАММА

по дисциплине: Аналитическая механика

по направлению подготовки:

03.03.01 «Прикладные математика и физика»

физтех-школа: ФПМИ

кафедра: теоретической механики

курс: 2

семестр: 4

Трудоемкость:

теор. курс: базовая часть – 3 зачет. ед.

лекции – 30 часов

Экзамен – 4 семестр

практические (семинарские)

занятия – 30 часов

лабораторные занятия – нет

ВСЕГО АУДИТОРНЫХ ЧАСОВ – 60 Самостоятельная работа
– 45 часов

Программу и задания составил:

к.ф.-м.н., доцент А. Б. Батхин

Программа принята на заседании

кафедры теоретической механики

30 ноября 2020 года

Заведующий кафедрой

д.ф.-м.н.

С. В. Соколов

1. Аксиоматика классической механики

Постулаты классической механики. Понятие силы. Инерциальные системы отсчёта и законы Ньютона. Группа преобразований Галилея, инвариантность уравнений механики.

2. Кинематика точки и твёрдого тела

Элементы дифференциальной геометрии кривых в \mathbb{R}^n : кривизна, кручение, трёхгранник Френе. Криволинейные координаты, коэффициенты Ламе. Скорость и ускорение точки в криволинейных координатах.

Комплексная форма описания плоскопараллельного движения точки и твёрдого тела. Алгебра кватернионов. Кватернионное описание кинематики твёрдого тела. Параметры Родрига–Гамильтона. Кватернионное сложение поворотов. Кватернионное уравнение Пуассона. Описание прецессионного движения. Представление винтового движения твёрдого тела с помощью дуальных чисел.

3. Лагранжев формализм

Связи и их классификация. Конфигурационное многообразие голономной системы. Обобщённые координаты и обобщённые скорости. Касательное расслоение и его свойства. Понятие гладкого многообразия.

Уравнения Лагранжа голономной системы с идеальными связями и их свойства: ковариантность, невырожденность. Преобразование функции Лагранжа. Первые интегралы лагранжевой системы.

Задача Кеплера. Комплексная форма уравнений движения. Понятие регуляризации уравнений движения. Сведение задачи Кеплера к задаче движения гармонического осциллятора. Законы Кеплера.

4. Гамильтонов формализм

Элементы выпуклого анализа: выпуклые функции и преобразование Юнга–Фенхеля. Преобразование Лежандра. Функция Гамильтона и её свойства. Канонические уравнения. Скобки Пуассона и их свойства. Первые интегралы системы Гамильтона. Понятие группы преобразований и алгебры Ли. Алгебры Ли гамильтонианов и первых интегралов. Теорема Якоби–Пуассона. Свойства фазового потока системы Гамильтона: теорема Лиувилля и теорема Пуанкаре о возвращении.

5. Вариационные принципы механики

Понятие задачи вариационного исчисления с закреплёнными концами. Вариационный принцип Гамильтона и уравнения Лагранжа. Варианты вариационного принципа (укороченное действие, принцип Мопертюи, принцип Якоби). Инфинитезимальная образующая группы симметрий. Теорема Э. Нётер. Законы сохранения основных динамических величин. Канонические преобразования.

6. Некоторые приложения аналитической механики

6.1. Динамика вблизи положения равновесия (ПР). Принцип виртуальных перемещений. Теоремы об устойчивости и неустойчивости ПР. Движение вблизи ПР: малые колебания вблизи устойчивого ПР, понятие нормальной формы уравнений движения по Пуанкаре, центральное многообразие и движения на нём.

6.2. Движении твёрдого тела с неподвижной точкой. Тензор и эллипсоид инерции твёрдого тела. Случай Эйлера: первые интегралы, геометрическая интерпретация Пуансо. Случай Лагранжа: первые интегралы. Свободная и вынужденная прецессия.

6.3. Периодические движения консервативной системы. Теория Флоке системы линейных уравнений с периодическими коэффициентами. Задача о движении N -тел. Центральные конфигурации. Хореографии и принцип наименьшего действия.

Литература

Основная

1. *Амелькин Н.И.* Лагранжева и гамильтонова механика: учеб. пособие. — Москва : МФТИ, 2014.
2. *Арнольд В.И.* Математические методы классической механики. — Москва : Физматлит, 1974.
3. *Болотин С.В., Карапетян А.В., Кугушев Е.И., Трещёв Д.В.* Теоретическая механика. — Москва : Издательский центр «Академия», 2010.
4. *Гантмахер Ф.Р.* Лекции по аналитической механике. — 3-е изд. — Москва : Физматлит, 2001.
5. *Журавлёв В.Ф.* Основы теоретической механики. — 2-е изд. — Москва : Физматлит, 2001; 3-е изд. — Москва : Физматлит, 2008.

6. *Маркеев А. П.* Теоретическая механика: учебник для университетов. — Изд. 3-е, испр. — Москва–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2007.

Дополнительная

1. *Барбашова Т. Ф., Кугушев Е. И., Попова Т. В.* Теоретическая механика в задачах. Лагранжева механика. Гамильтонова механика: учеб. пособие. — Москва : МЦНМО, 2013.
2. *Голдстейн Г., Пул Ч., Сафко Дж.* Классическая механика. — Москва–Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2012.
3. *Голубев Ю. Ф.* Основы теоретической механики. — 2-е изд. — Москва : Изд-во МГУ, 2000.
4. *Дубровин Б. А., Новиков С. П., Фоменко А. Т.* Современная геометрия: методы и приложения. — 2-е изд. — Москва : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1986.
5. *Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М.* Механика. — 5-е изд., стереотип. — Москва : Физматлит, 2012.
6. *Ханукаев Ю. И.* Введение в теоретическую механику: учеб. пособие. — Москва : МФТИ, 2017.
7. *Ханукаев Ю. И.* Кватернионы в механике, релятивистской физике, теории поля: учеб. пособие. — Москва : МФТИ, 2012.
8. *Яковенко Г. Н.* Краткий курс аналитической динамики. — Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.
9. *Ярошевский В. А.* Лекции по теоретической механике: учеб. пособие. — Москва : МФТИ, 2001.

ЗАДАНИЯ

Первое задание

(срок сдачи с 29 марта по 3 апреля 2021 г.)

Контрольная работа с 22 по 27 марта 2021 г.

1. Кинематика точки и твёрдого тела

1.1. Кинематика точки, криволинейные координаты

1.10, 1.15, 1.16, 1.37 д), 1.47

1.2. Плоскопараллельное движение

3.9, 3.14, 3.23, 3.29

Эти задания решить с использованием комплексной формы записи движения.

1.3. Кватернионы и дуальные числа

4.61 а), 4.66, 4.71, 4.77, 4.85, 4.93

1.4. Пространственное движение

4.6, 4.11, 4.29, 4.32, 4.38, 4.48

2. Лагранжев формализм

2.1. Уравнения Лагранжа. Циклические координаты

12.6 д), 12.8 в), 12.25, 12.39, 12.47, 12.59, 12.64, 12.103

2.2. Движение в центральном поле. Задача Кеплера

8.21, 8.37, 8.50

Т1. Под действием центральной силы точка массы m движется по дуге лемнискаты с уравнением $r^2 = a^2 \cos 2\varphi$, $a = \text{const}$. Доказать, что величина силы обратно пропорциональна седьмой степени расстояния r от точки до центра поля. Найти коэффициент пропорциональности.

3. Гамильтонов формализм

3.1. Функция Гамильтона и канонические уравнения

19.13, 19.19, 19.32, 19.47

3.2. Первые интегралы. Скобки Пуассона

20.12, 20.27, 20.28 в)

Второе задание

(срок сдачи с 10 по 15 мая 2021 г.)

Контрольная работа с 3 по 8 мая 2021 г.

4. Вариационные принципы механики

4.1. Принцип Гамильтона

21.4, 21.12, 21.20, 21.32

4.2. Теорема Нётер

21.42, 20.36, 20.46

5. Некоторые приложения аналитической механики

5.1. Динамика вблизи положения равновесия

14.7, 14.37, 15.2, 15.4 б), 15.15, 15.22, 16.40, 16.51, 16.70

5.2. Движения твёрдого тела с неподвижной точкой

11.7, 11.8(6), 11.17, 11.30, 11.61, 11.70

Т2. Однородная правильная четырёхугольная пирамида массой m , стороной основания a и высотой H соединена со сферическим шарниром внешней точкой O своего основания — вершиной основания. Пирамиду раскручивают вокруг оси, проходящей через центр масс C пирамиды и точку O , с угловой скоростью собственного вращения ω_1 .

1. Какой должна быть высота пирамиды H , чтобы она обладала динамической симметрией относительно указанной оси?
2. Какой надо задать в этом случае угол нутации θ , чтобы пирамида регулярно прецессировала с постоянной угловой скоростью $\omega_2 = 2\omega_1$?
3. Какой должна быть скорость собственного вращения, чтобы ось динамической симметрии была перпендикулярна оси прецессии?

Номера задач взяты из сборника Пятницкий Е.С., Трухан Н.М., Ханукаев Ю.И., Яковенко Г.Н. Сборник задач по аналитической механике. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : МФТИ, 2018.